

大眾對“毒物”的認知多為有急毒性或劇毒性的物質，然而若以錯誤的方式、錯誤的劑量或被錯誤的人使用，任何東西都可能有毒。

臺北榮總毒藥物防治諮詢中心，由醫師、藥師及護理師提供全年24小時電話諮詢，服務所有年齡階層，提供免費、保密且專業的諮詢協助。

毒物諮詢項目

- 家中常用清潔用品
- 農藥、環境殺蟲劑、殺鼠劑
- 工業用化學物質
- 毒蛇、毒魚、蜂等有毒動物
- 中草藥、有毒植物
- 非處方/處方藥物中毒或過量
- 職業性中毒
- 其他中毒相關問題



衛生福利部暨臺北榮民總醫院
毒藥物防治諮詢中心

02-28717121

免費、專業、即時
每年365天，每天24小時



<https://www.pcc-vghtpe.tw/tc/>



02-28717121

毒藥物諮詢專線



臺北榮民總醫院

毒藥物防治諮詢中心

全年無休24小時服務



健康家園確認清單

- ❑ 將02-28717121儲存於手機中，讓毒藥物防治諮詢中心成為您的毒物諮詢專屬聯絡人。
- ❑ 藥品、清潔劑、化妝品放在兒童拿不到的地方或帶有安全鎖的櫃子。
- ❑ 避免分裝藥品或清潔用品，並與食物明確分區保存。
- ❑ 妥善處理過期藥品，特殊藥品如針劑、抗腫瘤藥品、抗生素、荷爾蒙藥品及管制藥品必須拿回醫院或社區藥局回收。
- ❑ 確實閱讀並遵循產品或藥品上的使用說明，確認標示清晰、完整。
- ❑ 產品或藥品上的中毒急救處置可能有誤，如有中毒疑慮請來電諮詢。
- ❑ 看起來可以吃的不一定可食，請教導兒童在吃任何東西前詢問家長。
- ❑ 植物、首飾和鈕扣電池等小物件請放在兒童接觸不到的地方。
- ❑ 隨著家庭成員的改變或成長，請檢視家中存放物品方式之合適性。

誤食藥品為嬰幼兒及兒童常見意外中毒原因，成人使用的慢性病藥物對嬰幼兒而言可能是劇毒，甚至有一藥致命的風險，不可輕忽妥善保管藥品的重要性。家中嬰幼兒如有誤食以下五大類藥品，請勿催吐，並盡速致電毒藥物防治諮詢中心：

心血管用藥

鈣離子阻斷劑
乙型阻斷劑
強心劑

止痛用藥

嗎啡類止痛劑

身心科用藥


三環類抗鬱劑

血糖用藥

硫醯尿素類降血糖劑

止喘用藥

茶鹼類支氣管擴張劑



暴露可能中毒物質處置原則

如發生窒息、昏迷或癲癇發作等嚴重症狀，請立即撥打**119**尋求緊急援助。

如發生以下情況，請致電毒物中心
02-28717121



眼睛暴露

用大量流動清水由眼睛內側往外側沖洗，並致電毒藥物諮詢中心。



皮膚暴露

去除任何接觸毒物之衣物、飾品，並用大量清水沖洗皮膚後致電毒藥物諮詢中心。



呼吸道暴露

移動至有新鮮空氣流通處，並致電毒藥物諮詢中心。



口服暴露

勿催吐或使用民俗療法，以免造成吸入性肺炎，並致電毒藥物諮詢中心。