

■ 簡介

- 手術後的劇烈疼痛，是大多數人無法忍受的，據統計，以傳統之肌肉注射劑方式止痛，仍有超過百分之五十的病患，得忍受中度至強度之疼痛，究其原因多以無法獲得及時有效之減痛所致，這些病患在手術後，除須與病魔搏鬥，還得面對惱人的疼痛折磨，而疼痛對病患健康之恢復，非但無益，反而有害。
- 本院現採用之自控式減痛，病患於感覺疼痛時以自行控制之方式，立刻給予及時有效之減痛，此一人性化之設計，已大大改變病患對術後疼痛之恐懼，減少術後肺部之併發症，縮短住院時間，減少住院開銷，提高手術之滿意度。

■ 術後疼痛之害處

- 一、刺激身體分泌壓力激素，導致組織之崩解，延長身體之恢復。
- 二、刺激心臟血管系統，導致心跳快、血壓高、心肌缺氧、心律不整。
- 三、減緩腸胃蠕動，延後排氣。
- 四、耗損體力使身體的抵抗力變差。

- 因各人對疼痛之耐受力有別，本治療以達到病人靜止不動時，疼痛降至最低為原則。部分病患可能出現頭暈、噁心、皮膚癢，或其他不適反應之藥物副作用，但可以調整藥物量來減緩不適反應或克服。

- 因健保不給付，患者須自行付費，並填寫同意書，一至三天療程，有兩種方式，採用硬脊膜外病患自控式止痛術(PCEA)者，依據1~3天分別收費6,000、7,000及8,000元整；點滴式病患自控式止痛術(IVPCA)則依據使用天數1~3日分別收費5,500、6,500及7,500元整。第四日起每增加一日均加收1,000元，全部療程最多以七日為限。另外有多模式止痛，結合自控式止痛與非類嗎啡藥物，三日收費10,000元整。

■ 使用病患自控式減痛之優點

- 安全、方便、效果佳。
- 術後自控式減痛。
- 復原快，縮短住院時間。

臺北榮總麻醉部關心您
若欲接受疼痛治療服務，請向您的護理人員洽詢

