

臺北榮民總醫院疼痛控制科止痛藥物說明書

學名：Imipramine

中文商品名：妥富腦糖衣錠 英文商品名：Tofranil

為什麼醫師會開這個藥給我？

Imipramine 被用來治療慢性疼痛，對於神經疼痛特別有幫助，例如灼熱、閃電、刺痛等等的疼痛。

這個藥的作用機轉是甚麼？

Imipramine 是一種三環抗憂鬱劑(TCA)，有多種藥理作用，包括降低腎上腺素分解、抗組織胺、抗膽鹼及阻斷 5-HT₃ 接受體。主要作用在神經末梢，也被用來治療憂鬱症，可以讓周邊傳回腦部的神經訊號變少。

要怎麼吃這個藥？

您應該在固定時間吃藥，空腹或進食後吃都可以。這個藥物需要整顆配水吞下，糖衣錠不可以磨粉或咬碎，也不可以管灌餵食。

多久會開始作用？

藥物效果因人而異，有些人吃藥一到兩週後開始覺得有效，有的人需要吃到六到八週才感覺有效，有些人感覺不到效果，如果您感覺不到效果，請不要突然停藥，請與您的醫師討論後再來減藥。

藥物的副作用有哪些？

副作用常在服用幾天後會消失，但是如果您的副作用很強烈，請與您的醫師討論。

常見副作用有：嗜睡、噁心、暈眩、視線模糊、畏光、便秘、排尿不順、口乾舌燥、焦慮、心律不整、姿勢性低血壓、顫抖等等。

有哪些情況要注意的？

如果您有在服用其他止痛藥、抗憂鬱劑、抗癲癇藥物，請務必告知醫師。

有心臟病史、癲癇病史、肝臟病史、青光眼或如果您有攝護腺肥大、夜尿、排尿不順等問題，請務必告知醫師。

如果您有癲癇病史，Imipramine 可能增加癲癇風險。

Imipramine 可能使人嗜睡，剛開始服用藥物請不要開車，等適應劑量後可以開始開車。

服用 Imipramine 期間飲酒會使人嗜睡，請酌量飲酒。

如果忘記吃藥怎麼辦？

如果距離應該服用藥物時間間隔不到三小時，可以立刻吃原來的劑量，如果間隔時間超過三小時，請等到下次應該服用藥物時間再吃藥，請不要同時服用兩次的劑量。