



臺北榮民總醫院麻醉部止痛藥衛教單

平躁錠 25 毫克 (Amitriptyline tab 25 mg)



單張QR code

姓名：

病歷號：

日期：

藥品外觀

中文名	平躁錠 25 毫克	 
英文名	Pinsaun tab 25 mg (Amitriptyline)	
外觀描述	白色、圓形	
用法用量	口服，每日一至三次，每次 1-2 錠。	

用途與作用

此藥為一種三環抗憂鬱劑，除可調適情緒外亦具多種藥理作用。可作用於神經末梢，讓周邊神經回傳至腦部訊號減少，亦常用於慢性神經痛、偏頭痛或肌纖維痛之輔助治療。

如何使用

1. 每日一至三次，請依醫囑按時服藥。若需增減劑量，需緩慢進行。
2. 可磨粉後服用或管灌給藥。
3. 請儲存於室溫及乾燥的環境，遠離熱源及避免陽光直射。
4. 若忘記服藥，請當日儘快服用；若已接近下次服藥時間，請「不要」補服或同時服用兩次劑量。

可能發生的副作用有哪些？

頭暈、口乾、心悸、尿滯留、光敏感、姿勢性低血壓、視力模糊、便秘、心跳過速等。

注意事項

1. 本藥需按時持續使用一至二週才開始產生效果，少數人需使用四至六週後才能完全發揮療效，請勿自行停藥，避免戒斷性副作用。
2. 凡對本藥過敏、心肌梗塞、目前正在服用或是過去 14 天以內曾服用單胺氧化酶抑制劑的人，禁用本藥。
3. 本藥不可與 quinidine 類的抗心律不整藥物併用。
4. 有狹角性青光眼 (narrow-angle glaucoma) 問題，請務必告知醫師，避免使用。
5. 本藥可能會降低 clonidine、guanethidine、bethanidine、reserpine 與 methyldopa 的降血壓作用，若有需要應使用其他作用機轉降血壓藥 (如：利尿劑、血管擴張劑或β阻斷劑)。
6. 併用中樞神經抑制劑 (如：酒精、鎮靜劑、安眠藥、麻醉藥) 可能增強中樞抑制效果。
7. 在任何就醫情形下，您都應主動告知醫師、藥師及其他醫療人員「您正在服用本藥」。