



臺北榮民總醫院麻醉部止痛藥衛教單

妥富腦 糖衣錠 10 毫克 (Tofranil SC tab 10 mg)

單張QR code

姓名：

病歷號：

日期：

藥品外觀

中文名	妥富腦 糖衣錠 10 毫克		
英文名	Tofranil SC tab 10 mg (Imipramine)		
外觀描述	紅色、三角形		
用法用量	口服，每日 1-2 次，可空腹或與食物併服。		

用途與作用

此藥為一種三環抗憂鬱劑，除可調適情緒外，亦具多種藥理作用。可作用於神經末梢，讓周邊神經回傳至腦部訊號減少；也會經由加強腦部下行情神經調控機轉，亦常用於慢性神經痛治療。

如何使用

1. 每日 1-2 次，請依醫囑按時服藥。若需增減劑量，需緩慢進行。
2. 可磨粉後服用或管灌給藥。
3. 請儲存於室溫及乾燥的環境，遠離熱源及避免陽光直射。
4. 若忘記服藥，請當日儘快服用；若已接近下次服藥時間，請「不要」補服或同時服用兩次劑量。

可能發生的副作用有哪些？

頭暈、口乾、心悸、尿滯留、光敏感等。

注意事項

1. 本藥需按時持續使用幾個星期才會發揮完全的療效，請勿自行停藥，避免戒斷性副作用。
2. 凡對本藥過敏、心肌梗塞、目前正在服用或是過去 14 天以內曾服用單胺氧化酶抑制劑 (monoamine oxidase inhibitor) 的人，禁用本藥。
3. 副作用常在服用幾天後會消失，但是如果您的副作用很強烈，請與您的醫師討論。
4. 有狹角性青光眼 (narrow-angle glaucoma) 問題，請務必告知醫師，避免使用。
5. 本藥不可與 quinidine 類的抗心律不整藥物併用。
6. 本藥可能會降低 clonidine、guanethidine、bethanidine、reserpine 與 methyldopa 的降血壓作用，若有需要應使用其他作用機轉降血壓藥 (如：利尿劑、血管擴張劑或β阻斷劑)。
7. 併用中樞神經抑制劑 (如：酒精、鎮靜劑、安眠藥、麻醉藥) 可能增強中樞抑制效果。
8. 本藥經肝臟單胺氧化酶酵素系統代謝，因此併用肝臟酵素誘導劑 (如：barbiturates、phenytoin、carbamazepine、尼古丁、口服避孕藥) 可能加速此藥代謝，進而降低其療效。

9. 併用 warfarin 類口服抗凝血劑可能導致抗凝血作用增強。
10. 在任何就醫情形下，您都應主動告知醫師、藥師及其他醫療人員「您正在服用本藥」。
11. 勿飲酒及葡萄柚汁，以免增加副作用發生率。

藥師的叮嚀

1. 曾對陽光過敏者外出應防曬。