



# 臺北榮民總醫院麻醉部用藥衛教單

## 利瑞卡 膠囊 75 毫克 (Lyrica cap 75 mg)

單張QR code

姓名：

病歷號：

日期：

### 藥品外觀

中文名	利瑞卡 膠囊 75 毫克	
英文名	Lyrica hard cap 75 mg (Pregabalin)	
外觀描述	紅色 / 白色、PGN 75	
用法用量	口服，每日早晚各一次，可空腹或與食物併服	

### 為什麼疼痛科醫師會開這個藥給我？

利瑞卡被用來治療慢性疼痛，對於神經疼痛特別有幫助，例如灼熱、閃電、刺痛等等的疼痛。

### 用途與作用

糖尿病周邊神經病變疼痛、帶狀疱疹後神經痛、纖維肌痛、脊髓損傷所引起的神經性疼痛。此藥為一種抗癲癇藥，主要作用在神經細胞鈣離子通道，抑制傳回腦部的疼痛訊號，因此對於慢性疼痛也有幫助。

### 如何使用

1. 每日二至三次，請依醫囑緩慢增至有效劑量；如需停藥請與醫師討論，並以至少一週逐漸減量。
2. 可剝開後與水混合，立即服用或管灌給藥。
3. 請儲存於室溫及乾燥的環境，遠離熱源及避免陽光直射。
4. 若忘記服藥，請當日儘快服用；若已接近下次服藥時間，請「不要」補服或同時服用兩次劑量。

### 可能發生的副作用有哪些？

頭暈、嗜睡、水腫、體重增加、複視、顫抖、疲倦等。副作用通常在服藥幾天後消失，但若您的副作用很強烈，請與您的處方醫師討論。

### 注意事項

1. 緩解神經痛的時間可能需要一至二週或更久，若您感覺無效請勿自行停藥，避免戒斷性副作用。
2. 此藥品經腎臟排除，腎功能不良者醫師可能會調整劑量。
3. 在任何就醫情形下，您都應主動告知醫師、藥師及其他醫療人員「您正在服用本藥」。
4. 勿飲酒或酒精性飲品，避免增加鎮靜作用。
5. 請勿任意停藥，避免戒斷性副作用。
6. 可能引起嗜睡或複視，應避免開車、操作機械及需要警覺性的工作。
7. 有或疑似抗癲癇藥物過敏病史，請務必告知，我們將進行HLA-B 1502基因檢測，以確保用藥安全。