



# 臺北榮民總醫院麻醉部止痛藥衛教單

## 服安痛 膜衣錠 (複方) Traceton FC tab


單張QR code

姓名：

病歷號：

日期：

### ☛ 藥品外觀

中文名	服安痛 膜衣錠 (複方)	
英文名	Traceton FC tab (Tramadol 37.5 mg + Acetaminophen 325 mg)	
外觀描述	黃色、長圓柱形、YSP186	
用法用量	口服，每四至六小時服用 1-2 錠，可空腹或與食物併服。成人一天最多服用 8 錠。	

### ☛ 用途與作用

使用非鴉片類止痛藥無效之中至重度急慢性疼痛。

### ☛ 如何使用

1. 依症狀嚴重度，每四至六小時服用 1-2 錠。
2. 可磨粉後服用或管灌給藥。
3. 請儲存於室溫及乾燥的環境，遠離熱源及避免陽光直射。
4. 若忘記服藥，請當日儘快服用；若已接近下次服藥時間，請「不要」補服或同時服用兩次劑量。

### ☛ 可能發生的副作用有哪些？

便秘、腹痛、頭痛、疲倦、搔癢、肝指數異常。

### ☛ 注意事項

1. 曾對 tramadol 或 acetaminophen 過敏及目前正在服用或是過去 14 天以內曾服用單胺氧化酶抑制劑者，禁用本藥。
2. 發生酒精、安眠藥、麻醉藥、中樞作用止痛劑、精神藥物急性中毒時，禁用本藥。
3. 併用中樞神經抑制劑可能增加深度鎮靜及呼吸抑制風險，併用時應降低本藥劑量。
4. 併用含 carbamazepine 成分藥品，會增加 tramadol 代謝，降低止痛效果。
5. 併用 warfarin 類口服抗凝血劑，可能導致 INR 增加風險，需定期評估凝血時間。
6. 併用肝臟 CYP2D6 抑制劑(如：fluxetine、paroxetine、amitriptyline)可能輕微抑制本藥代謝。

7. 在任何就醫情形下，您都應主動告知醫師、藥師及其他醫療人員「您正在服用本藥」。
8. 勿飲酒及葡萄柚汁，以免增加副作用發生率。
9. 本藥品有輕微的潛在上癮性，過量或長期使用有潛在藥物成癮之風險。
10. 可能引起嗜睡，應避免開車、操作機械及需要警覺性的工作。

### 藥師的叮嚀

1. 本藥會穿過胎盤，懷孕期間使用本藥品可能導致新生兒產生鴉片類藥物戒斷症狀。特別在懷孕最後三個月時會增加此風險。
2. 因缺乏本藥在嬰兒及新生兒安全性研究，不建議哺乳婦女使用本藥。