

TECENTRIQ® 用法用量¹

TECENTRIQ®
atezolizumab

建議劑量及投予方式



固定劑量
1,200 mg
靜脈注射



60 分鐘
初次輸注

若病人能
耐受藥物



30 分鐘
後續輸注



每 3 週
給藥一次

用藥至疾病惡化或病人無法接受藥物為止

- 請勿以靜脈推注 (IV push) 或快速靜脈灌注 (IV bolus) 方式給藥。
- 請勿與其他併用藥品共用同一條靜脈輸注管線 (IV line)。
- 投予輸注液時，靜脈輸注管線可視需要 (**非必要**) 搭配無菌、無熱原且血漿蛋白結合率低的管線內過濾器 (in-line filter) 使用 (過濾器孔徑為 0.2 至 0.22 µm)。
- TECENTRIQ® 的處方資訊並未針對用藥前之藥物處置 (premedication) 給予建議。

劑量調整

暫時停用

發生以下情形應暫時停用 TECENTRIQ®：

- 第 2 級肺炎 (pneumonitis)
- AST 或 ALT >3 x 且 ≤ 5 x ULN，或總膽紅素 (total bilirubin) >1.5 x 且 ≤ 3 x ULN
- 第 2 或 3 級腹瀉 (diarrhea) 或結腸炎 (colitis)
- 有症狀的腦下垂體炎 (symptomatic hypophysitis)、腎上腺功能不全 (adrenal insufficiency)、甲狀腺機能低下 (hypothyroidism)、甲狀腺機能亢進 (hyperthyroidism)，或第 3 或 4 級的血糖過高 (hyperglycemia)
- 第 2 級眼睛發炎毒性 (ocular inflammatory toxicity)
- 第 2 或 3 級胰臟炎 (pancreatitis)，或第 3 或 4 級澱粉酶 (amylase) 或脂酶 (lipase) 濃度上升 (>2 x ULN)
- 第 3 或 4 級感染 (infection)
- 第 2 級輸注相關反應 (infusion-related reactions)
- 第 3 級皮疹 (rash)

重新使用

若病人的不良事件緩解至第 0 或 1 級，可重新開始使用 TECENTRIQ®。

永久停用

發生以下情形應永久停用 TECENTRIQ®：

- 第 3 或 4 級肺炎
- AST 或 ALT >5 x ULN，或總膽紅素 >3 x ULN
- 第 4 級腹瀉或結腸炎
- 第 4 級腦下垂體炎
- 任何等級的肌無力症候群 (myasthenic syndrome) / 重症肌無力 (myasthenia gravis)、Guillain-Barré 症候群，或腦膜腦炎 (meningoencephalitis)
- 第 3 或 4 級眼睛發炎毒性
- 第 4 級胰臟炎，或任何等級的復發性胰臟炎
- 第 3 或 4 級輸注相關反應
- 第 4 級皮疹

TECENTRIQ® 處方資訊並未建議降低劑量使用。



TECENTRIQ[®] 用法用量¹

藥品配製¹



1 ▶ 檢查

給藥前，一旦取得藥品溶液和容器後，均應觀察藥品是否有顆粒物或變色。TECENTRIQ[®] 為透明至淡黃色的溶液，若溶液呈現混濁或有變色情形，或溶液中有肉眼可見之顆粒物，應捨棄該藥品。請勿用力震搖藥品。



3 ▶ 混和

輕輕將已稀釋的溶液倒置，請勿大力震搖。



2 ▶ 抽藥

- 自藥瓶中抽取 20 mL 的 TECENTRIQ[®]。
- 將 TECENTRIQ[®] 稀釋到容量為 250 mL，以聚氯乙烯、聚乙烯或聚烯烴 (polyolefin) 為材質，且含有 0.9% 氯化鈉注射液的輸液袋內。
- TECENTRIQ[®] 僅能以 0.9% 氯化鈉注射液稀釋。



4 ▶ 丟棄

將剩下未用完的 TECENTRIQ[®] 或藥品的空瓶妥善丟棄。

藥品保存¹

本產品不含防腐劑，藥品配製後請立即使用。若 TECENTRIQ[®] 輸注液經稀釋後未立即使用，應以下列任一方式儲存：

- 若置於室溫下勿超過 6 小時，其包括輸液袋存放於室溫的時間，加上投予藥物的輸注時間。
- 若冷藏存放於 2°C 至 8°C (36°F 至 46°F) 下，則勿超過 24 小時。

請勿冷凍，並請勿大力震搖。

▶ **TECENTRIQ[®] 以 1,200 mg/20 mL 單一劑量包裝之藥瓶盛裝販售。**