

口腔手術後傷口引流之照護

一、手術目的：主要是引流口腔手術後沉積於體內之液體，以達成減壓、預防及治療感染。

二、照護重點：

(一) 傷口引流且連接引流袋之傷口照護：

1. 保持引流管之通暢，避免引流管內阻塞或外力壓迫、摺疊或扭曲，可利用安全別針或夾子，固定於衣服上。
2. 臥床時請採半坐臥姿以利傷口引流，並將引流袋自然垂掛於床緣適當固定。
3. 下床活動時，可將管子固定於衣服上，但不可高過於傷口。
4. 可依醫護人員指示，單手固定引流管近端，利用另一手拇指與食指沿著引流管遠端壓擠、滑動，避免血塊阻塞引流管。
5. 若發現下列情形，請告訴醫護人員處理：
 - (1) 引流管傷口有紅、腫、熱、痛任一情形，或有膿樣分泌物時。
 - (2) 傷口敷料滲溼時。
 - (3) 引流液突然增加大於 $50 - 100 \text{ ml/h}$ 或減少，及發現引流液超過引流袋的 $2/3$ 或引流球鼓起時。
 - (4) 引流管滑脫時。
 - (5) 引流液的顏色改變，例如：變為鮮紅色或乳白色。
6. 醫護人員會定時檢視您的傷口及引流液的狀況，並記錄之。
7. 當引流液的量逐漸減少時，約 $30 - 50 \text{ cc/24hr}$ 以下，醫師會視情形為您拔除引流管。
8. 引流管拔除後請多下床活動。

(二) 口內傷口引流未接引流袋之傷口照護：

1. 當覆蓋傷口之敷料滲溼時，請通知醫護人員處理。
2. 傷口有紅、腫、熱、痛、分泌物時，請通知醫護人員處理。

(三) 口內傷口引流管之傷口照護：

1. 勿用手或舌頭碰觸引流管，以免造成傷口感染、引流管脫落或舌頭破損。
2. 依醫護人員指導正確使用漱口水，維持口腔清潔。
3. 引流液可吞入或吐出，必要時請護理人員協助抽吸。
4. 依醫護人員指導選擇適合之飲食，如：流質或軟質飲食，進食後請務必清除口內食物殘渣及漱口，避免感染。

參考資料

Chris, B., & Maggie, N. (2012). Alexander's nursing practice (4th ed.).

Edinburgh: Churchill Livingstone.

Meg, G., & Judith, L. M. (2014). Nursing care plans: diagnoses, interventions, and outcomes (8th ed.). Philadelphia, MO: Elsevier/Mosby.

Pamela, A. B. (2013). Quick reference to wound care: palliative, home, and clinical practices (4th ed.). MA: Burlington.