


鼻倒生性乳突瘤


病例報告

本病患為一位 77 歲男性，過去無其他重大疾病史。病人因為鼻塞一個月，先至住家附近診所就診。經過一段時間治療後症狀並未緩解，因此前來本院鼻科門診就診。在本院診間，藉由鼻內視鏡檢查看到右側鼻腔內有一腫塊，在門診當場切片後送病理檢查，報告為息肉樣的慢性發炎組織。同時間我們也為病人安排了鼻竇電腦斷層檢查。電腦斷層影像上發現這個息肉樣組織將近 3 公分大，並且堵住了鼻竇開口造成慢性鼻竇炎。經過詳細的解說與討論，病人決定接受功能性內視鏡鼻竇手術切除鼻腔內息肉並同時治療慢性鼻竇炎。


術後切下的右側鼻內息肉樣組織，經過正式病理檢查確診為倒生性乳突瘤。病人手術後恢復良好，無術後出血或其他手術併發症的問題，於手術後隔天順利出院。經過內視鏡鼻竇手術治療後，病人鼻塞的症狀得到緩解，目前規律於本院門診接受鼻內視鏡檢查追蹤。



▲ 術前鼻內視鏡影像可見息肉樣組織



▲ 術前電腦斷層影像



▲術後鼻內視鏡影像，狀況恢復良好

討論

倒生性乳突瘤約占所有鼻內腫瘤的 0.5-4.0%，好發年齡為 40-60 歲且以男性居多。常見症狀與其他鼻腔內腫瘤類似，包含鼻塞、流鼻血、臉部疼痛。倒生性乳突瘤好發於鼻腔的中鼻道與中鼻甲附近，當倒生性乳突瘤持續變大時可能堵住鼻竇開口，妨礙了鼻竇的分泌物排出而造成鼻竇炎。倒生性乳突瘤若不手術切除，未來有轉為惡性腫瘤的機會，其機率約為 5%到 15%。因此，一旦鼻內視鏡下檢查到有鼻內腫瘤的增生，病患應接受切片檢查，若高度懷疑倒生性乳突瘤，需安排手術切除。目前倒生性乳突瘤的切除手術可在內視鏡下進行，配合先進的手術導航定位系統，可以準確且安全的完成而不傷害到頭部其他重要器官。倒生性乳突瘤在切除後有相當高的復發可能性，其復發率約為 15-78%，因此術後需按時回門診追蹤。

病歷編號：FAIDJFUG 文/整理：周成威醫師 指導：葉建甫醫師