


認識披衣菌感染

文 / 家庭醫學部住院醫師 陳明心



陳明心醫師檔案

現學專 職：臺北榮總家庭醫學部住院醫師
 歷：國防醫學院醫學系畢業
 長：家庭醫學、預防醫學

披衣菌是廣泛存在人類的傳染性致病原。主要經由性接觸或分娩時垂直接觸傳染，是最常見的性傳染疾病之一。其他經由性行為而感染的致病源還有人類免疫缺乏病毒、淋病雙球菌、梅毒螺旋體、人類乳突病毒、陰道滴蟲等，而披衣菌是目前散佈最廣的性傳染疾病。

在公共衛生條件較差的時期，缺乏乾淨日用水的地區，披衣菌可能藉由接觸受感染之體液或是受污染的毛巾傳染，常見為感染眼部造成結膜炎，俗稱砂眼。如今，隨著全球公共衛生條件的進步，開發中國家因感染砂眼披衣菌而導致失明的人口已經下降。

但是，披衣菌感染仍可能造成嚴重

的併發症。例如反覆披衣菌感染可能造成男性及女性不孕症。另外，孕婦若是感染披衣菌而未治癒，生產時有機會垂直傳染給新生兒，造成新生兒結膜炎、失明，也可能導致新生兒肺炎或其他呼吸道疾病，嚴重時引起新生兒死亡。

我有披衣菌感染嗎？

大多數披衣菌感染者沒有症狀，其餘感染者依性別區分，女性常見症狀包括：排尿灼熱感、陰道分泌物增加、性行為疼痛、下腹痛、下背痛、噁心、嘔吐、發燒以及陰道不正常出血等；男性常見症狀包括：產生尿道分泌物、睪丸腫脹或疼痛等症狀。

披衣菌感染的危險因子有哪些？

性生活較活躍的青少年、成年男

性及女性或是懷孕婦女都有可能感染披衣菌。2014年美國預防服務工作小組(USPSTF)建議報告指出，在美國，20至24歲區間男性及女性有最高的感染率。除了年齡之外，其他造成感染的危險因子包括：新的性伴侶、非單一性伴侶、共同性伴侶、已經感染性傳染疾病之性伴侶、非互相一夫一妻關係、金錢交易或毒品交易之性行為等。

如何預防感染？

預防披衣菌感染的方式中安全的性行為最為重要，不論陰道性交、肛交或口交，都應全程使用保險套，確保有固定單一的性伴侶，或只和確認未感染的性伴侶進行性行為。懷孕前檢測是否有披衣菌感染，除了排除不孕症原因，也能保障新生兒健康，降低新生兒眼炎及新生兒肺炎的發生機率。

披衣菌感染陽性怎麼辦？

目前，依據臺灣疾病衛生管理局規定，醫療院所檢測血清中的披衣菌抗體IgG篩檢是否感染披衣菌。然而，此抗體存在人體時間很長，可能大於10年，就算感染已經治療痊癒，檢測時仍然可能偵測得到抗體，而使結果呈現陽性。建議篩檢結果陽性的民眾，需進一步至婦產部或感染科部確定診斷，接受抗生素治療，並評估後續併發症產生之機會。

我想接受抗體檢查！

具有披衣菌感染風險者，應接受披衣菌感染篩檢。目前臺北市政府提供

婚後孕前健康檢查之補助方案，臺北市政府民政局推出「祝你好孕3.0」政策，符合資格的民眾可以多加利用。本院婚後孕前健康檢查即包含披衣菌抗體檢查項目，歡迎民眾至本院家庭醫學部體檢門診諮詢並接受檢查。

感染披衣菌 當心未來不孕症。

男性常見症狀

- 1.尿道有分泌物。
- 2.尿道開口處有刺痛感。
- 3.小便疼痛。
- 4.睪丸腫脹。

女性常見症狀

- 1.75~90%沒有症狀。
- 2.不規則的陰道出血。
- 3.小便疼痛。
- 4.下腹疼痛。
- 5.性交疼痛。
- 6.噁心嘔吐發燒。



藉由抽血方式，檢測血清中披衣菌抗體(IgG、IgM、IgA)若反應為陽性，代表曾經或正被披衣菌所感染，後續須接受藥物治療，直到確定痊癒。





榮 總 人

Taipei Veterans General Hospital Bulletin

441

110年2月號



傾聽基層聲音

許惠恒院長上任後積極走訪各單位，聽取基層同仁心聲，並於春節假期慰問值勤醫護人員；院長亦期勉同仁們在既有良好基礎持續精進，提供內、外部顧客感動且有溫度的服務。