

# 豬年向非洲豬瘟說不

**非洲豬瘟(African swine fever)**於 1921 年首次於非洲肯亞發現，是一種急性、高傳染性的**病毒**疾病，**發病過程短但死亡率高**，從野豬傳到家豬，從非洲傳到歐洲、南美洲、俄羅斯、亞洲等地，而且目前尚**無藥物可供治療及疫苗施打**。非洲豬瘟病毒**抗酸鹼能力強**，可存活於酸鹼值 pH 3~13，在室溫下**豬糞便中可存活 11 天**；未清洗的**豬舍中可存活 1 個月**；**冷藏豬肉產品中可存活 100 天**；**冷凍豬肉產品中可存活 1000 天**。

**豬**是非洲豬瘟病毒的**宿主動物**，潛伏期約 4~19 天。病毒會從口腔粘膜或扁桃腺進入豬隻，在體內複製後，會引起**消化道粘膜出血**進而出現**血痢**，病毒也出現在豬糞便中。常見臨床症狀為**高燒 (41~42°C)**、呼吸短促；**食慾不振**(厭食、精神沈鬱)；耳尖、腹部及四肢**末端皮膚可見紅斑、發紺**；嘔吐、下痢、**鮮紅色血痢**，並在 **4~10 天內快速死亡**。解剖上會看到**全身臟器的出血**：脾臟 2-3 倍腫大呈現深紅黑色、腎臟皮質點狀出血、淋巴結腫大出血壞死。

非洲豬瘟與豬瘟都由病毒引起，不同的是**豬瘟由 RNA 黃病毒引起**，而**非洲豬瘟是 20 面體具套膜的大型 DNA 非洲豬瘟類病毒引起**。傳染途徑以**接觸傳染**為主，可經由**廚餘、豬隻分泌物或排泄物、車輛及人員夾帶**等方式傳播。非洲豬瘟**只會感染豬**，病毒若進入水體不會透過魚類增殖，且在大量體積的水中(河川或湖泊)，病毒濃度將快速稀釋到低於豬隻最低感染劑量。另外，非洲豬瘟**不是人畜共通傳染病**，所以**不會傳染給人**，倘若誤食非洲豬瘟的豬肉，病毒不會經消化道粘膜進入體內繁殖，且在胃酸及消化道酵素作用下，病毒大多數會被殺死，很難在人糞便中檢出非洲豬瘟病毒。

為了避免非洲豬瘟病毒傳入，請民眾及養畜業者務必配合，**勿自中國大陸或其他疫區國家快遞或攜帶豬肉相關產品**，最高將處**新台幣 100 萬元罰鍰**；也**避免前往疫區國家的豬隻飼養場所參觀**，或接觸豬科動物相關人員，返國後應徹底消毒並於一週後再進入畜牧場，以確保安全。

# 非洲豬瘟小檔案

## 疾病種類

病毒性疾病  
DNA, Asfarviridae family

## 感染對象

造成家豬及野豬的急性、惡性傳染病，所有品種和年齡的豬均可能感染

## 主要傳播途徑



行政院農業委員會  
動植物防疫檢疫局

# 業者應注意事項

因仍無藥物或疫苗治療，感染豬隻須撲殺

發現豬隻異常應立即通報

養豬業者自中國大陸返臺時須消毒及隔離1週

養豬場內餵飼之廚餘，須符合蒸煮熟安全條件(達90°C，持續1小時)

航空及遊輪公司應將廚餘殘羹銷燬

行政院農業委員會  
動植物防疫檢疫局

# 民眾應注意事項

不要從國外帶肉類產品返國

不要走私動物或其產品返國

莫驚慌！  
非洲豬瘟  
不會傳染人類

行政院農業委員會  
動植物防疫檢疫局

# 政府強化措施

強化邊境管制措施

強化檢驗量能

強化宣導措施

盤點防疫物資

行政院農業委員會  
動植物防疫檢疫局

防範口蹄疫、非洲豬瘟入侵!!!  
旅客違規攜帶**肉類產品**入境  
最高將處以  
**新臺幣100萬元罰鍰**

發現/獲得來路不明肉品  
請撥打:0800-039131



真空包裝  
也躲不過我的鼻子



行政院農業委員會  
動植物防疫檢疫局



作者：包哲豪 醫師

經歷：國立陽明大學醫學系

現職：臺北榮民總醫院家庭醫學部住院醫師

專長：家庭醫學、預防醫學