

## 成人肺炎鏈球菌疫苗接種作業 Q&A

114 年 7 月版

### ➤ 實施對象

Q1：有關成人肺炎鏈球菌疫苗接種作業實施對象為何？

A：

1. 全國 65 歲以上【以 114 年為例，接種對象為 49 年次（含）以前出生】民眾；如為外籍人士，需具健保身分或持有效居留證。
2. 19-64 歲【以 114 年為例，實施對象為於民國 50 年（含）以後出生且 95 年（含）以前出生】符合侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險對象定義之民眾，如為外籍人士，需具健保身分或持有居留證。

※IPD 高風險對象定義如下，請檢具診斷書等相關佐證資料，或經醫師依民眾之健保就醫資料或病歷等評估後接種。

- (1) 脾臟功能缺損。
  - (2) 先天或後天免疫功能不全。
  - (3) 人工耳植入。
  - (4) 腦脊髓液滲漏。
  - (5) 一年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤者及器官移植者。
3. 全國 55-64 歲【以 114 年為例，接種對象為 59 年次（含）以前出生】原住民，需具原住民族身分。
  4. 年齡以「接種年」減「出生年」計算。

➤ 接種實務

Q2：有關本接種作業接種原則為何？

A：

1. 與其他疫苗可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。
2. 從未接種過 PCV13/15 及 PPV23 者應先接種 1 劑 PCV13，間隔至少 1 年（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週）再接種 1 劑 PPV23。
3. 曾接種 PPV23 且間隔至少 1 年者可接種 1 劑 PCV13。
4. 曾接種 PCV13/15 且間隔至少 1 年（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週）者可接種 1 劑 PPV23。
5. 如已接種過 PCV13/15 及 PPV23 者，代表已完整接種肺炎鏈球菌疫苗，無需再接種 PCV13 及 PPV23 疫苗。

Q3：如 IPD 高風險對象已接種 PPV23 接續的 PCV13 間隔也是至少 8 週嗎？

A：否，如 IPD 高風險對象已接種 PPV23 須間隔至少 1 年才能接種 PCV13。

Q4：如不確定自己是否為 IPD 高風險對象怎麼辦？

A：可至原就醫或長期追蹤之醫療院所，由醫師藉由病歷資料及專業評估是否符合 IPD 高風險對象。

Q5：如不記得以前有無接種過肺炎鏈球菌疫苗，可否公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：可至衛生所或合約醫療院所，請其協助查詢接種紀錄，若無接種紀錄，

則依接種原則提供 1 劑 PCV13 及 1 劑 PPV23 接種。

Q6：如已接種疫苗但未有接種紀錄，且欲循建議原則接種者，應如何接續接種公費疫苗？

A：建議先至原接種之醫療院所或衛生所進行補登，再依循接種建議接種，如已無法取得接種證明，經醫師評估可提供 1 劑 PCV13，再間隔至少 1 年（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週），再提供 1 劑 PPV23。

Q7：如已接種 PCV13/15，查無接種紀錄，能否得提供 PPV23 接種？

A：針對曾接種 PCV13/15，經查找仍無法取得接種紀錄之特例情形，為避免影響接種單位疫苗作業執行，對於堅持接種 PPV23 之民眾，得請其簽具聲明切結，陳述所言屬實且瞭解 PPV23 及 PCV13/15 接種順序對免疫保護效果之影響，於接種 PCV13/15 後間隔至少 1 年（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週），得提供 PPV23 接種。

Q8：如已自費接種 PCV13/15，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：依接種原則，已接種 PCV13/15 者，建議間隔至少 1 年（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週）可接種 1 劑 PPV23，就已完成接種，無須再接種 PCV13。惟若已自費接種 PCV13/15 者，民眾仍有公費接種 PCV13 需求，間隔至少 1 年，經醫師評估可公費提供 1 劑 PCV13。

Q9：如已自費接種 PPV23，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：依接種原則，已接種 PPV23 者，建議間隔至少 1 年可接種 1 劑 PCV13，就已完成接種，無須再接種 PPV23。

Q10：如已接種 PCV13/15 及 PPV23，可否再公費接種肺炎鏈球菌疫苗？

A：依接種原則，已接種 PCV13/15 及 PPV23 者，就已完成接種達保護效益，無須再接種 PCV13 及 PPV23。惟若已自費完成接種 PCV13/15 及 PPV23 者，民眾仍有公費接種 PCV13 需求，間隔至少 1 年，經醫師評估可公費提供 1 劑 PCV13。

Q11：PCV13 及 PPV23 可與其他疫苗同時接種嗎？

A：

1. 先接種 PCV13/15 間隔至少 1 年（IPD 高風險對象或 65 歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少 8 週）可接種 PPV23，如已先接種 PPV23 者須間隔至少 1 年才可接種 PCV13，但是和其他疫苗可同時接種於不同部位或間隔任何時間接種。
2. 另秋冬同時提供肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗及 COVID-19 疫苗，該三種疫苗可同時分開不同部位接種，亦或間隔任何時間接種，若同時接種三種疫苗，同手臂接種兩種疫苗建議距離至少 2.5 公分。

Q12：若 PCV13 及 PPV23 接種間隔不足是否需要補種？

A：請確實依接種間隔接種，若發生接種間隔不足，如 PCV13/15 與 PPV23 間隔不足 8 週，PPV23 與 PCV13/15 間隔不足 1 年等情形，不需補種。