

骨髓炎

一、什麼是骨髓炎

骨髓炎是一種致病微生物所引起的骨骼及骨髓組織的感染和發炎。廣義而言可能是化膿性細菌、梅毒，病毒或異物所引起；然而，通常「骨髓炎」一詞，係專指化膿性細菌所引起的發炎，而非結核或梅毒等引起的肉芽性發炎。

二、分類

1. 急性骨髓炎：常發生於兒童，男孩比女孩更易得病，小兒容易發生的部為以脛骨上端，股骨下端最常見；成人較少發生於長骨，而多發生於金黃色葡萄球菌是最常見菌的病。

2. 慢性骨髓炎：大多數是外傷性骨髓炎，少數是血因性骨髓炎所引起，易發於成人、革蘭氏陽、陰性桿菌都是常見的病菌。

三、如何治療：

外科清創手術的適應症為：

1. 經過 48-72 小時的內科療法。症狀仍然沒有改善時。

2. 確實有膿瘍存在時。

慢性骨髓炎治療方法：

外科清創術及抗生素治療。是治療慢性骨髓炎的兩大原則：

(1) 外科治療：

1. 清創術 2. 骨外固定術 3. 軟組織重建手術 4. 骨骼重建手術。

(2) 抗生素治療：

1. 全身抗生素治療 2. 局部抗生素治療

(3) 輔助治療：例如高壓氧治療

骨髓炎

一、什麼是骨髓炎

骨髓炎是一種致病微生物所引起的骨骼及骨髓組織的感染和發炎。廣義而言可能是化膿性細菌、梅毒，病毒或異物所引起；然而，通常「骨髓炎」一詞，係專指化膿性細菌所引起的發炎，而非結核或梅毒等引起的肉芽性發炎。

二、分類

1. 急性骨髓炎：常發生於兒童，男孩比女孩更易得病，小兒容易發生的部為以脛骨上端，股骨下端最常見；成人較少發生於長骨，而多發生於金黃色葡萄球菌是最常見菌的病。

2. 慢性骨髓炎：大多是外傷性骨髓炎，少數是血因性骨髓炎所引起，易發於成人、革蘭氏陽、陰性桿菌都是常見的病菌。

三、如何治療：

外科清創手術的適應症為：

1. 經過 48-72 小時的內科療法。症狀仍然沒有改善時。

2. 確實有膿瘍存在時。

慢性骨髓炎治療方法：

外科清創術及抗生素治療。是治療慢性骨髓炎的兩大原則：

(1) 外科治療：

1. 清創術 2. 骨外固定術 3. 軟組織重建手術 4. 骨骼重建手術。

(2) 抗生素治療：

1. 全身抗生素治療 2. 局部抗生素治療

(3) 輔助治療：例如高壓氧治療

病人簽名: _____ 家屬簽名: _____ 護理人員簽名: _____ 日期: _____