

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Etodolac (Lacoxa <sup>®</sup> ) SR tab 400 mg	止痛消炎/NSAID	Etoricoxib (Arcoxia <sup>®</sup> ) tab 60 mg	止痛消炎/COX-2 selective NSAID
Tramadol (Muaction <sup>®</sup> ) SR tab 100 mg	止痛/Opioid agonist analgesic	Trazodone (Mesyrel <sup>®</sup> ) tab 50 mg	調適情緒 /Triazolopyridine-derivat ive antidepressant

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Temozolomide	化學治療/ Alkylating agent (triazene)	Temodal <sup>®</sup> cap 20 mg Temodal <sup>®</sup> cap 100 mg Tamos <sup>®</sup> cap 100 mg
Entecavir	抗 B 型肝炎病毒/ Nucleoside reverse transcriptase inhibitor	Baraclude <sup>®</sup> tab 0.5 mg Baraclude <sup>®</sup> tab 1 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Colimycin <sup>®</sup> inj 66.8 mg 抗生素	Maxtam <sup>®</sup> inj 500 mg 與 beta-lactam 類抗生素併用 於治療細菌感 染	紅色瓶蓋、 紅/白色標 籤、透明玻 璃瓶、白色 乾粉
Feburic <sup>®</sup> FC tab 80 mg 降尿酸、治療 痛風	Keppra <sup>®</sup> FC tab 500 mg 抗癲癇、及其他 用途	黃色、長圓 柱形、單面 刻痕錠劑

4. 實例說明

案例 1 處方：Morefine<sup>®</sup> (chlorpromazine) tab 100 mg 1 tab tid 用於治療打嗝。

建議：將 chlorpromazine 劑量調整為 25 mg tid。

說明：Chlorpromazine 用於治療打嗝建議劑量為 25-50 mg tid-qid，建議調低劑量以減少副作用發生機率。

案例 2 處方：Xyzal<sup>®</sup> (levocetirizine) tab 5 mg 1 tab qd 用於皮膚搔癢。

建議：將 levocetirizine 劑量調整為 5 mg 1 tab qod。

說明：病患 Ccr 為 32 ml/min，因此建議將 levocetirizine 劑量調整為 5 mg 1 tab qod，以減少副作用發生機率。