

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
105 年第 1 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
EurICON [®] tab 50 mg	排除尿酸、治療痛風 /Uricosuric agent	Eurodin [®] tab 2 mg	安眠/Benzodiazepine
Ezetrol [®] tab 10 mg	降血脂/Cholesterol absorption inhibitor	Ebutol [®] tab 400 mg	抗結核/Antitubercular agent

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Venlafaxine	調適情緒/SNRI	Valosine [®] SR cap 75 mg Efexor [®] XR cap 75 mg Efexor [®] XR SR cap 37.5 mg
Tamsulosin	良性前列腺肥大症/ α_{1a} blocker	Harnalidge [®] D tab 0.2 mg Harnalidge [®] OCAS PR tab 0.4 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Sectral[®] FC tab 400 mg 降血壓、抗心 絞痛、抗心律 不整、及其他 用途</p> 	<p>Cardizem[®] retard tab 90 mg 降血壓、抗心絞 痛、及其他用途</p> 	<p>白色、 圓形、 大小相近</p>
<p>Eltroxin[®] tab 0.1 mg 補充甲狀腺 素</p> 	<p>Lanoxin[®] tab 0.25 mg 強心、及其他用 途</p> 	<p>白色、 圓形、 大小相近</p>

4. 實例說明

案例 處方：Acyclovir inj 500 mg q8h 用於治療帶狀皰疹，以台大 3 號輸液稀釋後發生白色沉澱物。

建議：建議依照仿單指示以氯化鈉、葡萄糖或複合乳酸鈉靜脈輸液稀釋。

說明：Acyclovir 配製後 pH 值約為 11，然台大 3 號輸液因 pH 值介於 4.0-7.5 之間，且另含有鉀、氯、磷酸鹽及醋酸鹽等各種電解質，因此可能影響 acyclovir 注射液配製之 pH 值及安定性，造成白色沉澱。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路