





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Rifapentine tab 150 mg	抗結核、抗細菌 /Antituberculosis	Rifampicin cap 300 mg, 450 mg	抗結核、抗細菌 /Antituberculosis
Setoral [®] inj 0.3 mg/2 ml	止吐/5-HT ₃ antagonist	Setron [®] inj 3 mg/3 ml	止吐/5-HT ₃ antagonist

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Atomoxetine	改善注意力/SNRI	Strattera [®] hard cap 25 mg Strattera [®] hard cap 40 mg
Paliperidone	調適情緒/2nd generation atypical antipsychotic	Invega [®] ER tab 3 mg Invega [®] ER tab 9 mg Invega [®] sustenna PR susp. for IM inj 100 mg Invega [®] sustenna PR susp. for IM inj 150 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Kascoal[®] tab 40 mg 消除脹氣</p> 	<p>Foliromin[®] FC tab 50 mg 補充鐵質</p> 	<p>白色、圓形、大小相近</p>
<p>Nexium[®] powder for iv inj 40 mg 治療消化性潰瘍</p> 	<p>Pantoloc[®] iv inj 40 mg 治療消化性潰瘍</p> 	<p>白色凍晶乾粉、透明玻璃小瓶、含量相同</p>

4. 實例說明

- 案例 1** 處方：Docetaxel inj 120 mg (75 mg/m² Q3W)以 NS inj 100 ml 稀釋，用於治療乳癌。
建議：將 NS inj 100 ml 改為 250 ml，以符合建議稀釋濃度。
說明：Docetaxel 可使用 NS 或 D5W 稀釋，稀釋後最終濃度應小於 0.74 mg/ml。
- 案例 2** 處方：Ertapenem inj 1000 mg 以 D5W-1/2NS 稀釋，用於治療肺炎。
建議：改以不含葡萄糖之輸液稀釋此藥。
說明：含葡萄糖輸液會降低 ertapenem 效價。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路