

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Glufast [®] tab 10 mg	降血糖/Antidiabetic agent (meglitinide analog)	Glucophage [®] tab 500 mg	降血糖、及其他用途/Antidiabetic agent (biguanide)
Isoptin [®] SR FC tab 240 mg	降血壓、抗心絞痛、抗心律不整、及其他用途/Calcium channel blocker (nondihydropyridine)	Inspra [®] FC tab 50 mg	利尿、改善水腫、降血壓、及其他用途/Aldosterone receptor antagonist

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Aripiprazole	調適情緒/Second generation antipsychotic agent (atypical)	Abilify [®] tab 5 mg Abilify [®] tab 15 mg
Metoclopramide	促進腸胃蠕動、止吐/Antiemetic; prokinetic agent	Primperan [®] tab 5 mg Promeran [®] inj 7.68 mg/2 ml

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Miacalcic [®] inj 50 iu/ml 1 ml 治療骨質疏鬆、治療高血鈣、及其他用途	Nimbex [®] inj 2 mg/ml 5 ml 鬆弛肌肉(神經肌肉接合處阻斷劑)	白藍色外盒、大小相近
Medicon-A [®] cap 鎮咳、祛痰	Quinidine [®] NYSCO cap 200 mg 抗心律不整、及其他用途	白色膠囊、大小相近

4. 實例說明

案例 1 處方：Depakine[®] gastro-resistant tab 200 mg (Valproate) 2# NGT QD，用於治療腦瘤引起的抽搐。

建議：將 Depakine[®] gastro-resistant tab 改為 Depakine oral sol 200 mg/ml 2 ml NGT QD。

說明：Depakine[®] gastro-resistant tab 腸溶劑型，不建議管灌使用。

案例 2 處方：Onglyza[®] FC tab 5 mg (Saxagliptin) 1# PO QD，用於治療腎功能不良 (Ccr 25 ml/min)之糖尿病人。

建議：將 Onglyza[®] 改為 0.5# PO QD。

說明：Onglyza[®] 須依腎功能調整劑量，Ccr <50 ml/min 時，建議劑量為 2.5 mg QD。