

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
104 年第 4 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Epinephrine inj 1 mg/1 ml	腎上腺素/ $\alpha\beta$ adrenergic agonist	Epirubicin inj 10 mg及50 mg	化學治療/Anthracycline
Dophilin [®] tab 2 mg	降血壓、改善攝護腺肥大症狀、及其他用途/ $\alpha 1$ blocker	Dorison [®] tab 4 mg	類固醇 (有多種用途) / Glucocorticoid

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Mycophenolate mofetil	抗排斥、調節免疫、及其他用途 / Immunosuppressant agent	Cellcept [®] cap 250 mg Immufine [®] cap 250 mg
Haloperidol	調適情緒/Typical antipsychotic	Binin-U [®] inj 5 mg/1 mL Haldol decanoas [®] inj 50 mg/1 ml Hopan [®] tab 5 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Muaction [®] SR tab 100 mg 止痛	Cardizem [®] retard tab 90 mg 降血壓、抗心絞痛、及其他用途	白色、 圓形、 大小相近
Transamin [®] inj 250 mg/5 ml 止血	Trandate [®] inj 5 mg/ml 5 ml 降血壓、治療心臟病、及其他用途	透明液體、 透明安瓿、 白色標籤

4. 實例說明

案例 處方：Januvia[®] (sitagliptin) tab 100 mg 1 tab qd 用於 Ccr 為 33 ml/min 之糖尿病人。
建議：改為 sitagliptin 0.5 tab qd，並持續監測腎功能及血糖變化。
說明：Sitagliptin 必須依腎功能調整劑量：Ccr 30-50 ml/min 建議劑量為 50 mg qd；
Ccr <30 ml/min 及接受血液或腹膜透析病人，建議劑量為 25 mg qd。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路