





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Colimycin® inj 66.8 mg	抗細菌 (抗生素) / Polymyxin antibiotic	COLOmycin® inj 1 MIU	抗細菌 (抗生素) / Polymyxin antibiotic
Vesanoid® soft cap 10 mg	化學治療 / Retonoic acid	Vepesid® cap 50mg	化學治療 / Mitotic inhibitor

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Clindamycin	抗細菌 (抗生素) / Lincosamide antibiotic	CLINcin® inj 150 mg/mL 2mL Lindacin® cap 150 mg Cleocin® T topical 1% sol 30mL

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Chlorpheniramine® tab 4 mg VPP 抗過敏</p> 	<p>Midorine® tab 2.5 mg 升血壓、及其他用途</p> 	<p>白色、圓形、大小相近</p>
<p>Agrylin® cap 0.5 mg 治療血小板過多症</p> 	<p>Medicon-A® cap 鎮咳、祛痰</p> 	<p>白色膠囊、大小相近</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：U-Vanco® (vancomycin) inj 1000 mg IV qd，用於治療腹膜炎合併正在接受腹膜透析之慢性腎病患者。

建議：將頻次改為 qod，並監測 vancomycin 血中濃度。

說明：Vancomycin 用於腹膜透析患者，建議用法用量為 500-1000 mg q48-72h，並應嚴密監測 vancomycin 血中濃度，以確保療效及避免副作用。

案例 2 處方：Gemzar® (gemcitabine) inj 1600mg IV stat 輸注 100 分鐘，用於治療轉移性非小細胞肺癌病人。

建議：將輸注時間改為 60 分鐘。

說明：Gemcitabine 輸注時間大於 60 分鐘可能增加發生嚴重血液毒性的風險。因此建議將輸注時間改為 60 分鐘以內。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路