

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊  
104 年第 2 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Calgalin <sup>®</sup> tab 667 mg	降血磷/ Phosphate removing agent	Calglon <sup>®</sup> inj 10% 10 ml	補充鈣質/Calcium supplement
Leunase <sup>®</sup> inj 5000 ku	化學治療/ Antineoplastic agent	Leustatin <sup>®</sup> inj 10 mg/10 ml	化學治療/ Antineoplastic agent

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Sulpiride	調適情緒 /Typical antipsychotic	Dogmatyl <sup>®</sup> tab 50 mg Susine <sup>®</sup> tab 200 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Diamin<sup>®</sup> tab 80 mg 降血糖</p> 	<p>Prednisolone<sup>®</sup> tab 5 mg 類固醇</p> 	<p>白色、 圓形、 大小相近</p>
<p>Dophilin<sup>®</sup> tab 2 mg 降血壓、改善 攝護腺肥大 症狀、及其他 用途</p> 	<p>Mopride<sup>®</sup> tab 5 mg 促進腸胃蠕動</p> 	<p>白色、長圓 柱形、刻 痕、大小相 近</p>

4. 實例說明

**案例 1** 處方：MabThera<sup>®</sup> (rituximab) inj 700 mg IV 輸注 4 小時（第一次使用），用於治療慢性淋巴球性白血病患者。

建議：第一次輸注時建議起始輸注速度為 50 mg/hr，並監測是否發生輸注過敏反應相關症狀如發燒、畏寒、寒顫、低血壓、蕁麻疹、血管性水腫等。

說明：Rituximab 之嚴重輸注過敏反應，通常發生在第一次輸注後 30 分鐘至 2 小時內，因此建議起始輸注速度為 50 mg/hr，30 分鐘後可每隔 30 分鐘以 50 mg/hr 的幅度提高輸注速度，但最高不可超過 400 mg/hr。

**案例 2** 處方：Tarceva<sup>®</sup> (erlotinib) tab 150 mg 1 tab qd 用於轉移性非小細胞肺癌病人，同時給予 MgO tab 250 mg 1 tab tid 作為制酸劑使用。

建議：將 MgO 改為中午、晚上及睡前使用。

說明：增加上胃腸道 pH 值之藥品可能會降低 erlotinib 的溶解度，因而減少其生體可用率及藥效，因此建議制酸劑應和 erlotinib 分隔數小時給予。