

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Primacor <sup>®</sup> inj 10 mg/ 10 ml	短期改善心衰竭 /Phosphodiesterase-3 inhibitor	Primperan <sup>®</sup> inj 10 mg/2 ml	止吐、促進胃排空 /Prokinetic agent, dopamine receptor antagonist
Revolade <sup>®</sup> tab 25 mg	促進血小板生長 /Thrombopoietic agent	Revatio <sup>®</sup> tab 20 mg	治療肺動脈高壓 / Phosphodiesterase-5 inhibitor

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Clozapine	調適情緒 / Atypical antipsychotic	Clozaril <sup>®</sup> tab 100 mg Clopine <sup>®</sup> tab 25 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Revatio <sup>®</sup> tab 20 mg 治療肺動脈 高壓	Semper <sup>®</sup> tab 25 mg 治療噁心、嘔 吐、暈眩	白色、 圓形、 大小相近
Fuprostate <sup>®</sup> tab 250 mg 抗癌藥	Depakine <sup>®</sup> chrono tab 500 mg 抗癲癇	白色、 橢圓形、 有刻痕

4. 實例說明

**案例 1** 處方：Zovirax<sup>®</sup> (acyclovir) inj 500 mg IV q8h 輸注 30 分鐘，用於治療帶狀皰疹病人。  
建議：輸注時間至少須 60 分鐘且維持適當輸液量，並監測腎功能變化及注射部位是否發生靜脈炎。

說明：Acyclovir 輸注時間過短容易在腎臟形成結晶沉澱，造成腎功能惡化，因此建議輸注時間至少須 60 分鐘且維持適當輸液量。

**案例 2** 處方：Revolade<sup>®</sup> (eltrombopag) tab 25 mg 1 tab qd 用於原發性血小板缺乏症病人，同時給予 MgO tab 250 mg 2 tab bid 作為緩瀉使用。

建議：將 MgO 改為中午及晚上使用。

說明：鎂、鈣、鐵及鋁等多價陽離子會降低 eltrombopag 的吸收，進而影響藥效，因此建議 eltrombopag 併用 MgO 時應至少間隔 4 小時。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路