

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
103 年第 4 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Afatinib tab 40 mg	抗癌藥/EGFR inhibitor	Afinitor [®] tab 5 mg	抗癌藥/mTOR kinase inhibitor
Ventol [®] liquid 5.34 mg/ml 60 ml	支氣管擴張/Xanthine derivatives	Ventolin [®] inh. sol 5 mg/2.5 ml	支氣管擴張/Beta ₂ -adrenergic agonist

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Rivaroxaban	抗凝血 / Factor Xa inhibitor	Xarelto [®] tab 10 mg Xarelto [®] tab 15 mg Xarelto [®] tab 20 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Feburic[®] SC tab 80 mg 降尿酸</p> 	<p>Ultracet[®] tab 止痛</p> 	<p>黃色、 長圓柱形、 大小相近</p>
<p>Merislon[®] tab 12 mg 抗眩暈</p> 	<p>Neuquinon[®] SC tab 10 mg Coenzyme Q10</p> 	<p>鋁箔片、 10 粒排裝、 藍色字體</p>

4. 實例說明

- 案例 1** 處方：Xarelto[®] 15 mg (rivaroxaban) 1 tab PO qd 用於 Ccr 13 ml/min 的心房顫動病人。
建議：改為 Coumadin[®] tab 5 mg (warfarin) 0.5 tab PO qd，並監測 INR 以調整劑量。
說明：Rivaroxaban 不建議使用於 Ccr <30 ml/min 病人，因此建議改為 warfarin。
- 案例 2** 處方：Harnalidge[®] OCAS[®] PR tab 0.4 mg (tamsulosin) 1 tab qd 用於鼻胃管給藥病人。
建議：改為 Harnalidge[®] D 0.2 mg 1 tab bid。
說明：Harnalidge[®] OCAS[®] PR 為持續釋放膜衣錠，不可剝半或磨粉，因此建議改為 Harnalidge[®] D 持續釋放口溶錠，可加水溶解後以鼻胃管給藥。
- 擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路