

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊  
103 年第 3 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Epirenamin HCl® inj 1 mg/1 ml	氣管擴張/ Alpha /beta adrenergic agonists	Ephedrine HCl® inj 40 mg/1 ml	氣管擴張/ Alpha /beta adrenergic agonists
Anxiedin® tab 0.5 mg	安眠、抗痙攣/ Benzodiazepine	Anxicam® inj 2 mg/1 ml	安眠、抗痙攣/ Benzodiazepine

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
		Flagyl® oral tab 250 mg
Metronidazole	抗生素/ Anaerobic antibiotic	Medazole® iv infu 0.5% 100 ml
		Sutrol® gel-vaginal 7.5 mg/g 25 g

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Keto® inj 30 mg/1 ml 止痛</p> 	<p>Progesterone® inj 25mg/ml 荷爾蒙</p> 	<p>透明液體、 透明安瓿 紅色標示</p>
<p>Dipyridamole® SC tab 25 mg 血管擴張</p> 	<p>Neuquinon® SC tab 10 mg 改善心臟機能</p> 	<p>橙色、圓型錠劑 銀色鋁箔</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：醫師開立 Exjade® dispersible tab 125 mg (Deferasirox) 1 tab qdac PO 治療病人因輸血引起的鐵質沉著症。

建議：改用 Exjade® dispersible tab 125 mg (Deferasirox) 6 tab qdac PO。

說明：Exjade® 起始劑量依輸血量及血中 ferritin 值而有不同，約為 10-20 mg/kg，因此以 60 kg 成人為例，至少須使用每天 5 tab 劑量，此病人在計算後給予每日 6 tab。

案例 2 處方：Ciproxin® tab 250 mg (ciprofloxacin) 2 tab q12h PO 用於腎功能不佳 (Ccr 35 ml/min) 病人。

建議：降低劑量為 Ciproxin® tab 250 mg (ciprofloxacin) 1tab q12h PO。

說明：Ciproxin 約 30-50% 經腎臟排除，腎功能不良患者須調降劑量，故建議用於 Ccr 30-50 ml/min 病患須調降劑量至 250-500 mg q12h，Ccr <30 則為 250-500 mg q18h。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路