

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
103 年第 2 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Gascon® tab 40 mg	治脹氣 / Anti-flatulents	Geodon® cap 40 mg	抗精神病 / Atypical antipsychotics
Chlorpheniramine® inj 5mg/1 ml	抗組織胺 / Anti-histamines	Chloramphenicol® eye drop 0.25% 5ml	抗生素 / Antibiotic

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Aspirin	非類固醇抗消炎藥/ NSAID	Bokey® EM cap 100 mg Ropal® tab 100 mg Aspirin protect® tab 100 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Feburic® FC tab 80 mg 降尿酸</p> 	<p>Ultracet® tab (Tramadol 37.5 mg+ Acetaminophen 325 mg) 止痛</p> 	<p>黃色、 長圓柱形 錠劑</p>
<p>Lunging® tab 100 mg 抗結核菌</p> 	<p>Anxiedin® tab 0.5 mg 鎮靜安眠</p> 	<p>綠色標示、 銀色鋁箔</p>

4. 實例說明

- 案例 1** 處方：醫師開立 Adalat® cap 5 mg (Nifedipine) 1 tab PO qd 治療病人高血壓。
建議：改用 Adalat OROS® tab 30 mg (Nifedipine) 1 tab PO qd。
說明：Adalat® cap 5 mg 短效不適用於長期高血壓控制，建議改成長效型 Adalat OROS 使用。
- 案例 2** 處方：Invanz® inj 1 g (Ertapenem) 1000 mg IV qd 功能不佳 (Ccr 25 ml/min)病人。
建議：降低劑量為 Invanz® inj 1 g (Ertapenem) 500 mg IV qd。
說明：Invanz 原形藥約 40% 經腎臟排除，腎功能不良患者須調降劑量，故建議用於 Ccr <30 ml/min 病患須調降劑量至 500 mg qd。
- 擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路