

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
103 年第 1 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Ceflexin® cap 500 mg	抗生素 / Cephalosporins	Celebrex® cap 200 mg	止痛消炎/ COX-2 selective NSAIDs
Avodart® soft cap 0.5 mg	攝護腺肥大/5-alpha reductase inhibitor	Atrovent® nebuliser 0.5 mg/2 ml UD	擴張氣管 / Anticholinergic bronchodilator

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Levetiracetam	抗癲癇/ Anticonvulsant	Keppra® for infusion 500 mg/5 ml Keppra® oral sol 100 mg/ml 300 ml Keppra® FC tab 500 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Covorin® inj 50 mg/5 ml 活性葉酸</p> 	<p>Anxicam® inj 2 mg/1 ml 鎮靜、安眠</p> 	<p>棕色安瓿、 白色標籤、 黑色標示、 冰箱冷貯</p>
<p>Depakine® inj 400 mg, 4 ml 抗癲癇</p> 	<p>Targocid® for inj 400 mg/3 ml 抗生素</p> 	<p>白色外盒、 藍色/紅色標示</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：病患有高血壓及良性攝護腺肥大問題，醫師同時開立 Doxaben® XL tab 4 mg (doxazosin) 1 tab PO qn 與 Urief® cap 4 mg (Silodosin) 1 cap PO bid 併用。

建議：停用 Urief® cap 4 mg (Silodosin)。

說明：Doxaben XL 與 Urief 均屬 alpha-1 blocker，併用為重複藥效，因病患合併高血壓，建議繼續使用 Doxaben XL。

案例 2 處方：Pantoloc® iv inj 40 mg (Pantoprazole) 使用 Taita No.3 稀釋。

建議：更改輸液為 NS 500 ml。

說明：Proton pump inhibitor 針劑如 Pantoloc®、Nexium®、Omezol® 只能稀釋於 NS 與 D5W，使用其他輸液可能發生沉澱或變色。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路