





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Medason® inj 125 mg	類固醇 / Glucocorticoid	Methasone® inj 5 mg/1 ml/vl	類固醇 / Glucocorticoid
Lescol® XL tab 80 mg	降血脂 / HMG-CoA reductase inhibitor	Livalo® FC tab 2 mg	降血脂 / HMG-CoA reductase inhibitor

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Tacrolimus	免疫抑制劑 / Immunosuppressant agent	Advagraf® PR cap 1 mg Prograf® cap 0.5 mg、Prograf® cap 1 mg Protopic® oint 0.03% 5 g、Protopic® oint 0.1% 5 g

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Apidra® sol pen 100 u/ml 3 ml 胰島素</p> 	<p>Lantus® sol pen 100 iu/ml 3 ml 胰島素</p> 	筆型針劑
<p>Liq brown mixture® w/opium 120 ml 鎮咳</p> 	<p>Cough mixture® 0.2 ml/ml 120 ml 鎮咳、祛痰</p> 	棕色液體、 塑膠瓶

4. 實例說明

**案例 1** 處方：醫師開立 Meitifen® SR FC tab 75 mg (diclofenac) 1 tab PO qd 及 1 tab PO bidprn 給病人止痛。

建議：更改處方為 Meitifen® SR FC tab 75 mg (diclofenac) 1 tab PO qd 及 1 tab PO qnprn。

說明：Diclofenac 每日最大劑量為 150 mg，原處方每日使用 225 mg 超過最大劑量，須降低劑量至 150 mg 使用。

**案例 2** 處方：Augmentin® for iv inj 600 mg (Amoxycillin 500 mg + Clav.100 mg) 1200 mg IVA q8h 以 NS 500 ml+20 mEq KCl 稀釋使用。

建議：更改為不含 KCl 輸液，如 NS 500 ml。

說明：Augmentin 與 KCl 不相容，置於室溫 4 小時效價約降低 10%。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路