





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Nasacort [®] Aq 55 mcg/dose	過敏性鼻炎 / Steroids	Vitacal [®] inj 2% 20 ml	鈣離子補充 / Calcium
Nasonex [®] Aq. nasal 50mcg/dose	過敏性鼻炎 / Steroids	Vitacicol [®] inj 100mg/2ml	維生素 C 補充 / Vitamin C

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Risperidone	精神分裂症 / Atypical antipsychotics	Risperdal [®] tab 1 mg
		Risperdal [®] tab 2 mg
		Risperdal [®] oral soln 1 mg/ml 30 ml/bot
		Risperdal [®] consta susp for IM inj 25 mg/vial
		Risperdal [®] consta susp for IM inj 37.5 mg/vial

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>D.M.P.[®] tab 10 mg 止噁心、嘔吐</p> 	<p>Arava[®] FC tab 10 mg 治風濕性關節炎</p> 	<p>白色圓形錠劑</p>
<p>Pradaxa[®] cap 150 mg 預防血栓</p> 	<p>Micardis[®] tab 80 mg 降血壓</p> 	<p>銀色鋁箔 黑色標示</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：病人因大腸癌使用 FOLFIRI 療程治療，開立 Eloxatin[®] for infu. (Oxaliplatin) 100 mg 稀釋至 NS 250 ml 中。

建議：更改處方為稀釋至 D5W 250 ml 中

說明：Eloxatin[®] for infu. (Oxaliplatin) 稀釋於含氯離子 (Cl⁻) 溶液會快速代謝降低效果，故建議稀釋液改為不含氯離子溶液如 D5W 等，以增加藥品穩定性。

案例 2 處方：Onglyza[®] tab 5 mg (Saxagliptin) 1 tab PO qd 用於腎功能不佳 (Ccr 37.3 ml/min) 病人。

建議：更改處方為 Onglyza[®] tab 5 mg (Saxagliptin) 0.5 tab PO qd

說明：Onglyza 大部分由腎臟排除，腎功能不良病患需調降劑量，故建議於 Ccr < 50 ml/min 病患，調降劑量至 2.5 mg qd。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路