

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊  
102 年第 1 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Xyzal <sup>®</sup> FC tab 5 mg	抗過敏/ 2 <sup>nd</sup> generation H1-antihistamines	Xatral XL <sup>®</sup> tab 10 mg	降血壓、治攝護腺肥大/ Alpha-1 blockers
Mizollen <sup>®</sup> tab 10 mg	抗過敏/ 2 <sup>nd</sup> generation H1-antihistamines	Merislon <sup>®</sup> tab 12 mg	止暈 / Vasodilators

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Nifedipine	降血壓 / Calcium channel blocker	Adalat <sup>®</sup> cap 5 mg
		Adalat <sup>®</sup> OROS tab 30 mg
		Coracten <sup>®</sup> cap 20 mg
		Nifecardia <sup>®</sup> SR FC tab 30 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
PK-Merz <sup>®</sup> tab 100 mg 抗帕金森氏症	Morefine <sup>®</sup> tab 100 mg 抗精神病、止打嗝	橙色圓形錠劑
Trileptal <sup>®</sup> tab 300 mg 抗癲癇	Kepra <sup>®</sup> tab 500 mg 抗癲癇	黃色橢圓形錠劑

4. 實例說明

**案例 1** 處方：新開立 Amaryl<sup>®</sup> tab 2 mg (Glimepiride) 於註記磺胺類藥物過敏史之糖尿病患  
建議：處方更改為其他非 sulfonylureas 類降血糖藥物

說明：Sulfonylureas 類降血糖藥物包含 Amaryl<sup>®</sup> (Glimepiride)、Diamicron MR<sup>®</sup> (Gliclazide MR)、Minidiab<sup>®</sup> (Glipizide) 等，屬磺胺類藥物，糖尿病患對磺胺類藥物過敏時，應建議改用其他非 sulfonylureas 類降血糖藥物。

**案例 2** 處方：Imdur CR<sup>®</sup> tab 60 mg (Isosorbide-5-mononitrate) 1 tab qd 用於鼻胃管給藥病人  
建議：處方更改為 Ismo-20<sup>®</sup> tab 20 mg (Isosorbide-5-mononitrate) 1 tab bid NGT

說明：Imdur CR<sup>®</sup> 為緩釋劑型，延長作用時間至大於 12 小時，磨粉給藥則破壞此劑型，故建議更改為同成份的 Ismo-20<sup>®</sup> 使用。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路