

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊
101 年第 4 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Cataflam® SC tab 25 mg	止痛藥 / NSAID	Catapres® tab 0.075mg	降血壓 / Central α -adrenergic agonist
Norvasc® tab 5 mg	降血壓 / CCB	Nolvadex® tab 10 mg	抗腫瘤藥 / Selective estrogen receptor modulators

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Montelukast	治療氣喘 / Leukotriene receptor antagonist	Singulair® oral granules 4mg/wp Singulair® chewable tab 5 mg Singulair® tab 10 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Bethanechol® tab 25 mg 膽鹼刺激劑	Delcopan SR® tab 60 mg 止咳	銀色鋁箔、 藍色標示
Vitacicol® inj 100 mg 維生素 C	Laston® inj 30 mg 止痛	玻璃安瓿、 白色標籤、 紅色標示

4. 實例說明

案例 1 處方：使用 Fentanyl® Trans patch 2.5 mg/tap 1tap q3d 於從未用過 morphine 止痛的癌症病患
建議：先從 morphine 開始使用

說明：鴉片類止痛藥須從低劑量開始逐漸增加藥量，快速增量會出現噁心、意識混亂、鎮靜、呼吸抑制等症狀，Fentanyl® Trans patch 2.5 mg/tap 1 片約相等於每天口服 morphine 60-134 mg，因此建議每天口服 morphine 累積劑量超過 60 mg 才轉換成 Fentanyl® Trans patch 使用

案例 2 處方：Rifater® SC tab (Rifampicin 120 mg + INH 80 mg + PZA 250 mg) 5 tab PO qdac 用於體重 42 kg 肺結核病人

建議：更改為 Rifater® SC tab 4 tab PO qdac

說明：Rifater® 劑量於體重 40-49 kg 病患應每日使用 4 tab，> 50 kg 者每天使用 5 tab。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路