

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊
101 年第 2 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Lamictal® tab 50 mg	抗癲癇 / Phenyltriazone	Lamisil® tab 250 mg	抗黴菌 / Allylamine
Zovirax® inj 250 mg	抗病毒 / Nucleoside	Zyvox® inj 600 mg	抗生素 / Oxazolidinone

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Ropinirole	抗巴金森氏症、腿部躁動症 / Dopamine agonist	Requip® FC tab 0.25 mg Requip® PD PR tab 2 mg Requip® PD PR tab 8 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Kytron® inj 3 mg/3 ml 止吐劑</p> 	<p>Trandate® inj 5 mg/5 ml 降血壓、 治療心臟病</p> 	白底標籤、 玻璃安瓿
<p>Halcion® tab 0.25 mg 安眠</p> 	<p>Xanax® tab 0.5 mg 解除焦慮、 鎮靜</p> 	黑色標示、 銀色鋁箔

4. 實例說明

案例 1 處方：Takepron® OD tab 30 mg (Lansoprazole) 1# PO qdac 用於治療幽門螺旋桿菌
建議：更改使用頻次為 bidac

說明：幽門螺旋桿菌三合一療法中，Lansoprazole 標準用法應為每日兩次。

案例 2 處方：Cubicin® inj 500 mg (Daptomycin) 450 mg IVA qd 使用 D5W 為輸注溶液
建議：更改輸液為 NS 或 LR

說明：Cubicin® 與含葡萄糖稀釋液不相容，於室溫放置 24 小時效價約降低 15-20%。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路