

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊
101 年第 1 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Espin EM [®] cap 100 mg	預防心肌梗塞 /NSAID 降血壓	Erispan [®] tab 0.25 mg	抗焦慮、肌肉鬆弛 / Benzodiazepine
Olmotec FC [®] tab 20 mg	Angiotensin II receptor antagonists	Omezol [®] inj 40 mg	抑制胃酸分泌 /Proton pump inhibitor

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Lorazepam	抗焦慮 / Benzodiazepine	Anzepam [®] tab 0.5 mg Silence [®] tab 1 mg Neuropam [®] inj 2 mg/1 ml

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Medason [®] inj 125 mg 類固醇	Fadin [®] inj 20 mg 抑制胃酸分泌	綠色瓶蓋、 白底標籤、 大小相近
Bipiden [®] inj 5 mg/1 ml 治療帕金森氏症	Progesterone [®] inj 25 mg/1 ml 黃體素	透明液體、 透明安瓿、 藍點紅字

4. 實例說明

案例 1 處方：Sevatrim[®] inj 5 ml (SMX 400 mg + TMP 80 mg) 2 amp IVA q8h 之輸液 D5-1/2S inj 500 ml 添加 Humulin-R[®] 5 iu

建議：停止添加 Humulin-R[®] 5 iu

說明：Sevatrim[®]與 Humulin-R[®]不相容，會導致藥物混濁、沉澱而影響療效。

案例 2 處方：Pantoloc[®] tab 40 mg 1 tab PO qdac 給予鼻胃管給藥之病人。

建議：更改為其它 PPI，如：Nexim[®]、Takepron[®]、Pariet[®]等。

說明：詢問醫師得知本例 Pantoloc[®]確為 NGT 給藥，但因其為腸溶劑型不適磨粉，故建議改為其它 PPI。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路