

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊
100 年第 3 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Binin-U [®] inj 5 mg/1 ml	抗精神病 / Typical antipsychotic	Burinex [®] inj 2 mg/4 ml	利尿劑 / Loop diuretic
Detantol [®] R FC tab 3 mg	降血壓 / Selective α_1 -blocker	Detrusitol [®] SR cap 4 mg	治療膀胱過動症 / Muscarinic receptor antagonist

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Quetiapine	抗精神分裂症 / Atypical antipsychotic	Seroquel [®] tab 25 mg
		Seroquel [®] XR ER tab 200 mg
		Seroquel [®] XR ER tab 300 mg
		Utapine [®] FC tab 200 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Furoxime[®] inj 1.5 g 抗生素</p> 	<p>Pisutam[®] inj 2.25 g 抗生素</p> 	<p>藍色瓶蓋、 白底標籤、 玻璃瓶裝</p>
<p>Gipamine[®] inj 600 mg/200 ml 治療休克、 心衰竭</p> 	<p>Glycerol[®] inj 10% 250 ml 降腦壓</p> 	<p>黑色標示、 透明軟袋</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：Zometa[®] inj 4 mg/5 ml (Zoledronic acid) 4 mg IVA qpm ×14 day

建議：更改使用頻次

說明：Zometa[®] 用於已產生骨轉移之乳癌病人時，給藥頻次應為每 3-4 週一次，每次輸注時間至少 15 分鐘。

案例 2 處方：Lantus[®] inj 100 iu/ml 10 ml (Insulin glargine) 15 ml SC tid

建議：應改為 Lactul[®] syrup 666 mg/ml 500 ml (Lactulose) 15 ml PO tid

說明：病人血糖控制穩定 (< 150 mg/dL)，醫師卻將原處方 Lantus[®] inj 14 iu SC qd 修改為 15 ml SC tid，去電詢問後，確認為輸錯藥物，正確品項應為 Lactul[®]。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路