

台北榮總藥劑部調劑/給藥警訊
100年第2期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Glucobay [®] tab	降血糖 / α -glucosidase inhibitor	Glucophage [®] tab	降血糖 /Biguanide
Dianlin [®] inj 10 mg/2 ml	抗焦慮、肌肉鬆弛 /Benzodiazepine	Dilantin [®] inj 250 mg/5 ml	抗癲癇 /Hydantoin

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Acetylcysteine	化痰 /Mucolytic agent	Actein [®] 、granules、66.7 mg/g 3g/sachet Fluimucil A [®] 、tablet、600 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Promostan[®] inj 20 mcg 前列腺素</p> 	<p>Solu-cortef[®] inj 100 mg 類固醇</p> 	<p>黃色瓶蓋， 透明玻璃瓶， 瓶身標示為 白底</p>
<p>Unasyn[®] inj 1500 mg 抗生素</p> 	<p>Diflucan[®] inj 100 mg/50 ml 抗黴菌</p> 	<p>藍白顏色之 外盒</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：Humulin-N[®] inj 100 IU/ml (Insulin NPH) 10 IU IV HS

建議：將途徑 IVA 改為 SC

說明：Humulin-N 為中效型胰島素，劑型為懸浮注射液，應以皮下給藥，不可以靜脈給藥。

案例 2 處方：Rinderon-A[®] eye sol 0.1% 5 ml (Betamethasone+fradiomycin) X1 BOT BID TEL

建議：應改為 Rinderon-A[®] oph oint 0.1% 3 g (Betamethasone)

說明：原處方途徑 TEL 為局部塗抹於外眼瞼(eyelid)，但劑型為眼藥水，不易停留於眼瞼，經詢問原處方醫師後，確認為處方開立疏失，正確應為 Rinderon-A[®] oph oint。

擬 奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路