

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Neurontin [®] cap 100 mg	抗癲癇、及其他用途 /Anticonvulsant (GABA analog)	Neuquinon [®] tab 10 mg	改善心臟機能 /Coenzyme Q10
Natrilix [®] SR tab 1.5 mg	利尿、改善水腫、降血壓 (含磺胺) /Thiazide diuretic	Starlix [®] tab 120 mg	降血糖/Antidiabetic agent (Meglitinide analog)

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Finasteride	治療男性禿頭/5 α -Reductase inhibitor	Propecia [®] tab 1 mg
	治療攝護腺肥大、及其他用途/ 5 α -Reductase inhibitor	Proscar [®] tab 5 mg
Pentoxifylline	預防血栓、改善血液循環/ Blood viscosity reducer agent	Fylin [®] FC tab 400 mg Trental [®] tab 100 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Unasyn [®] inj 1500 mg 抗細菌	Vfend [®] inj 200 mg 抗黴菌	藍白包裝 盒、大小相近
Neuquinon [®] tab 10 mg 改善心臟機能	Dipyridamole "CYH" tab 25 mg 血管擴張 (預防血栓、改善血液循環)	橙色、圓形、大小相近

4. 實例說明

案例 1 處方：多發性骨髓瘤病人處方 Velcade[®] (Bortezomib) inj 2.3 mg IM STAT。

建議：將 Velcade[®] 給藥途徑改為 SC 或 IV push。

說明：Velcade[®] 建議用法用量為 1.3 mg/m²，以 2.5 mg/ml 之濃度 SC 或 1 mg/ml 之濃度 IV push。

案例 2 處方：念珠菌腹膜炎病人初次處方 Eraxis[®] (Anidulafungin) inj 100 mg IV STAT。

建議：將 Eraxis[®] 劑量改為 200 mg。

說明：Eraxis[®] 起始劑量為 200 mg，之後每天給予 100 mg。