

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊  
107 年第 1 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Edurant FC tab <sup>®</sup> 25 mg	抗病毒/Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor	Edarbi <sup>®</sup> tab 40 mg	降血壓、治療心衰竭、及其他用途 /Angiotensin II receptor blocker
Arimidex <sup>®</sup> tab 1 mg	調節荷爾蒙 /Aromatase inhibitor	Aromasin <sup>®</sup> SC tab 25 mg	調節荷爾蒙 /Aromatase inhibitor

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Zolpidem	安眠/Hypnotic	Stilnox <sup>®</sup> CR tab 6.25 mg Stilnox <sup>®</sup> FC tab 10 mg Zolnox <sup>®</sup> FC tab 10 mg
Diclofenac	止痛消炎、退燒/Nonsteroidal anti-inflammatory drug	Flamquit <sup>®</sup> tab 25 mg Meitifen <sup>®</sup> SR tab 75 mg Dicloren <sup>®</sup> supp 12.5 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Sinatrix<sup>®</sup> for iv inj 1 g 抗細菌(抗生素/第三代頭孢子菌類)</p> 	<p>Veterin<sup>®</sup> for inj 1000 mg 抗細菌(抗生素/第一代頭孢子菌類)</p> 	<p>白色乾粉、透明玻璃小瓶、白色標籤、藍色瓶蓋</p>
<p>Trandate<sup>®</sup> inj 5 mg/ml 5 ml 降血壓、治療心臟病、及其他用途</p> 	<p>Uromitexan<sup>®</sup> inj 400 mg/4 ml 預防出血性膀胱炎</p> 	<p>透明液體、透明安瓿、白色標籤</p>

4. 實例說明

**案例 1** 處方：Clexane<sup>®</sup> inj 6000 anti-Xa iu/0.6 ml (Enoxaparin) SC Q12H，用於治療腎功能不良 (Ccr 26 ml/min) 之深部靜脈栓塞病人。

建議：將 Clexane<sup>®</sup> 頻次改為 QD。

說明：Clexane<sup>®</sup> 須依腎功能調整頻次，Ccr <30 ml/min 時，建議劑量及頻次為 100 anti-Xa iu/kg/dose SC QD。

**案例 2** 處方：Baraclude<sup>®</sup> tab 0.5 mg (Entecavir) PO QDAC，用於治療腎功能不良 (Ccr 25 ml/min) 之 B 型肝炎病人。

建議：將 Baraclude<sup>®</sup> 頻次改為 Q3D。

說明：Baraclude<sup>®</sup> 須依腎功能調整頻次，Ccr 10-29 ml/min 時，建議頻次為 Q3D。

