

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊  
107 年第 2 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Sinemet <sup>®</sup> 25/100 tab	抗巴金森氏症 /Anti-Parkinson's agent	Sinzac <sup>®</sup> cap 20 mg	調適情緒/Selective serotonin reuptake inhibitor
Valdoxan <sup>®</sup> FC tab 25 mg	調適情緒/Melatonergic agonist	Valosine <sup>®</sup> SR cap 75 mg	調適情緒 /Serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Metformin	降血糖、及其他用途/ Biguanide	C.T.L. <sup>®</sup> XR tab 500 mg Glucophage <sup>®</sup> tab 500 mg
Valsartan	降血壓、治療心衰竭、及其他用途/Angiotensin II receptor blocker	Diovan <sup>®</sup> tab 80 mg Valsart <sup>®</sup> tab 160 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Galvus <sup>®</sup> tab 50 mg 降血糖	Certican <sup>®</sup> tab 0.5 mg 抗排斥、調節免疫、及其他用途	紅色標示、 銀色鋁箔
Pradaxa <sup>®</sup> cap 110 mg 抗凝血	Micardis <sup>®</sup> tab 80 mg 降血壓、治療心衰竭、及其他用途	黑色標示、 銀色鋁箔

4. 實例說明

案例 1 處方：處方 Pantoloc<sup>®</sup> tab 40 mg (Pantoprazole) 1# NGT QD 用於病患。

建議：將 Pantoloc<sup>®</sup> 改為 Nexium<sup>®</sup> 或 Dexilant<sup>®</sup> DR。

說明：Pantoloc<sup>®</sup> 為腸溶膜衣錠，不建議管灌使用。Nexium<sup>®</sup> 經胃管給藥時，應把 Nexium<sup>®</sup> 錠劑放在適當的注射器中，注入水約 25 ml；Dexilant<sup>®</sup> DR 經胃管給藥時，應打開 Dexilant<sup>®</sup> DR 膠囊，將全部的細粒放入裝有 20 ml 開水的容器中。

案例 2 處方：Unasyn<sup>®</sup> (Ampicillin 1 g + Sulbactam 0.5 g) inj 3000 mg IV Q6H 用於腎功能不良 (Ccr 38 ml/min) 之菌血症病人。

建議：將 Unasyn<sup>®</sup> 頻次改為 Q8H。

說明：Unasyn<sup>®</sup> 須依腎功能調整頻次，Ccr 10-50 ml/min 時，建議頻次為 Q8-12H。