

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Pentasa <sup>®</sup> PR granules 2 g (Mesalazine)	治療潰瘍性結腸炎 /5-Aminosalicylic acid derivative	Protase <sup>®</sup> EC cap 280 mg (Pancrelipase)	助消化(內含消化酵 素)/Digestant
Novamin <sup>®</sup> tab 5 mg (Prochlorperazine)	止吐、抗眩暈、治療緊 縮型頭痛/ Antiemetic (phenothiazine derivative)	Novonorm <sup>®</sup> tab 1 mg (Repaglinide)	降血糖/Antidiabetic agent (meglitinide analog)

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Domperidone	促進腸胃蠕動、止吐/ Dopamine antagonist	D.M.P. <sup>®</sup> tab 10 mg Domperid <sup>®</sup> suppository 10 mg Wempty <sup>®</sup> suspension 1 mg/ml 60 ml
Betamethasone	類固醇 (有多種用途,例如治療 濕疹、抗皮膚炎等)/Topical corticosteroid	Rinderon-V <sup>®</sup> cream 0.06% 5 g Septon <sup>®</sup> sol-gel 0.64 mg/g 10 g

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Agglutex<sup>®</sup> inj 1000 u/ml 5 ml 抗凝血</p>	<p>Medason<sup>®</sup> for inj 125 mg 類固醇 (有多 種用途)</p>	<p>綠色瓶蓋、 透明玻璃小 瓶、大小相 近</p>
<p>Buscopan<sup>®</sup> inj 20 mg/ml 1 ml 抗消化 道及泌尿道 痙攣</p>	<p>Tramal<sup>®</sup> inj 100 mg/2 ml 止痛</p>	<p>透明液體、 透明安瓿、 白色標籤</p>

4. 實例說明

**案例 1** 處方：處方 Eliquis<sup>®</sup> FC tab 5 mg (apixaban) 1# PO QD 用於非瓣膜性心房纖維顫動之病患。(此病患年齡 98 歲，體重 66 kg，Ccr 24 ml/min)

建議：將 Eliquis<sup>®</sup> 改為 2.5 mg PO BID。

說明：Eliquis<sup>®</sup> 的半衰期約 12 小時，建議 BID 給藥以達有效抗凝血作用。

**案例 2** 處方：Efexor<sup>®</sup> XR cap 75 mg (venlafaxine) 1# PO BID 用於治療泛焦慮症且 Ccr 11 ml/min 之病患。

建議：將 Efexor<sup>®</sup> 改為 75 mg 1# PO QD 或 37.5 mg 1# PO BID。

說明：Efexor<sup>®</sup> 用於泛焦慮症之建議劑量為 75-225 mg/day，Ccr <30 ml/min 時須調降劑量為 ≤50%。