

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊  
107 年第 4 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Kivexa <sup>®</sup> FC tab	抗病毒/Antiretroviral, protease inhibitor (anti-HIV)	Kaletra <sup>®</sup> tab	抗病毒/Antiretroviral, reverse transcriptase inhibitor (anti-HIV)
Dificid <sup>®</sup> FC tab 200 mg	抗細菌/Antibiotic (macrolide)	Diflucan <sup>®</sup> cap 150 mg	抗黴菌/Antifungal agent (azole)

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Aripiprazole	調適情緒/Second generation (atypical) antipsychotic agent	Abilify <sup>®</sup> tab 5 mg Abilify <sup>®</sup> tab 15 mg Abilify <sup>®</sup> Maintena inj 400 mg
Everolimus	抗排斥、調節免疫、標靶治療及其他用途/ mTOR kinase inhibitor	Certican <sup>®</sup> tab 0.5 mg Votubia <sup>®</sup> tab 2.5 mg Afinitor <sup>®</sup> tab 5 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Anxicam<sup>®</sup> inj 2 mg/1 ml 解除焦慮、鎮靜、安眠、放鬆肌肉、及其他用途</p> 	<p>Covorin<sup>®</sup> inj 100 mg/10 ml 活性葉酸</p> 	<p>白色標籤、棕色安瓿</p>
<p>Radi-K<sup>®</sup> tab 595 mg 補充鉀離子</p> 	<p>Muaction<sup>®</sup> SR tab 100 mg 止痛</p> 	<p>白色、圓形、大小相近</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：Plendil<sup>®</sup> ER tab 5 mg (Felodipine) 1# NGT QD 用於高血壓病人。

建議：將 Plendil<sup>®</sup> 改為 Coniel<sup>®</sup>、Nobar<sup>®</sup>、Norvasc<sup>®</sup> 或 Zanicidip<sup>®</sup>。

說明：Plendil<sup>®</sup> 為長效錠，不宜管灌使用，建議改用其他可管灌投予之 CCB 同類藥品。

案例 2 處方：Amantadine 100 mg 1# PO BID 用於治療腎功能不良(Ccr 35 ml/min)之帕金森氏症病人。

建議：將 Amantadine 頻次改為 QD。

說明：Amantadine 須依腎功能調整劑量或頻次，Ccr 30-50 ml/min 時，建議劑量為第一天 200 mg，第二日以後每日 100 mg。