

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
108 年第 1 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Xatral® XL tab 10 mg (alfuzosin)	改善攝護腺肥大症狀 /α1-Blocker	Xanax® tab 0.5 mg (alprazolam)	解除焦慮、鎮靜、放鬆 肌肉、及其他用途 /Benzodiazepine
Amolin® susp 50 mg/ml 60 ml (amoxicillin)	抗細菌/Penicillin	Ampolin® inj 500 mg (ampicillin)	抗細菌/Penicillin

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Fentanyl	止痛、麻醉/Anilidopiperidine opioid	Durogesic® D-Tran patch 12 µg/hr Fentanyl "PPCD" inj 0.1 mg/2ml Fentanyl "PPCD" patch 25 µg/hr Fentanyl "PPCD" patch 50 µg/hr Painkyl® buccal soluble films 200 mcg
Rituximab	標靶治療/CD20 單株抗體	Mabthera® for inj 100 mg/10 ml Mabthera® for inj 500 mg/50 ml Mabthera® for SC inj 1400 mg/11.7 ml

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Rosis® tab 40 mg VPP 利尿、改善水腫、降血壓	Crestor® FC tab 10 mg 降血脂	淺紅、圓形、大小相近
Ketosteril® tab 補充氨基酸	Klaricid® tab 500 mg 抗細菌	黃色、長圓柱形、大小相近



4. 實例說明

案例 1 處方：處方 Innomustine® inj (bendamustine) 180 mg (120 mg/m²) IV 以 NS 100 ml 稀釋，用於治療濾泡性淋巴瘤病患。(稀釋濃度為 1.8 mg/ml)

建議：將 Innomustine®改以 NS 500 ml 稀釋。

說明：Innomustine®建議稀釋濃度範圍為 0.2-0.6 mg/ml，且限用 NS 稀釋。

案例 2 處方：Veterin® inj (cefazolin) 1 g IV Q8H 用於治療血液透析病患之泌尿道感染。

建議：將 Veterin®改為 1 g IV Q24H，同時在血液透析後給予 0.5 g，並視情況調整劑量

說明：Veterin®用於治療血液透析病患之建議劑量為 1-2 g IV Q24-48H，同時應在血液透析後給予 0.5-1 g。

擬奉核後，影印分發各藥局公告週知及鋪陳於網路