

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
108 年第 2 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Burinex [®] tab 1 mg (Bumetanide)	利尿、改善水腫、降血壓/Loop diuretic	Binin-U [®] tab 5 mg (Haloperidol)	調適情緒/First generation (typical) antipsychotic
Zytiga [®] tab 250 mg (Abiraterone acetate)	調節荷爾蒙 /Antineoplastic antiandrogen	Zykadia [®] cap 150 mg (Ceritinib)	標靶治療/ Anaplastic lymphoma kinase inhibitor

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Ciprofloxacin	抗生素/Fluoroquinolone antibiotic	Cinolone [®] FC tab 250 mg Ciproxin [®] infu sol 200 mg/100 ml Seforce [®] inj 2 mg/ml 100 ml
Mesalazine	治療潰瘍性結腸炎 /5-aminosalicylic acid derivative	Asacol [®] gastro-resistant * tab 800 mg Colasa [®] enema 20 mg/ml 100 ml Pentasa [®] PR granules 2 g Pentasa [®] supp 1 g

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Millisrol[®] inj 5 mg/10 ml 抗心絞痛、治療心衰竭、及其他用途</p> 	<p>Covorin[®] inj 100 mg/10 ml 活性葉酸</p> 	<p>透明液體、棕色安瓿、大小相近</p>
<p>Loxol[®] SR tab 75 mg 祛痰</p> 	<p>Foliromin[®] FC tab 50 mg 補充鐵質</p> 	<p>銀色鋁箔、綠色字體</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：處方 Meitifen[®] SR FC tab 75 mg (Diclofenac) 1 tab NGT QDCC 用於鼻胃管病患止痛使用。

建議：將 Meitifen[®] 改以同成份非特殊劑型的 Flamquit[®] FC tab 25 mg NGT TIDCC 給藥。
說明：Meitifen[®] 為持續釋放膜衣錠，不適合管灌給藥。

案例 2 處方：Morefine[®] FC tab 100 mg (Chlorpromazine) 1 tab PO TID 用於治療打嗝。

建議：將 Morefine[®] 1 tab PO TID 改為 0.25 tab PO TID，並視情況調整劑量。
說明：Morefine[®] 用於打嗝之建議劑量為 25-50 mg PO TID 或 QID。