

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
108 年第 3 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Brintellix [®] FC tab 10 mg (Vortioxetine)	調適情緒/Serotonergic antidepressant	Brillinta [®] FC tab 90 mg (Ticagrelor)	預防血栓/Platelet aggregation inhibitor
Mag. sulfate [®] inj 10 % 20 ml (Mag. sulfate) /Electrolyte supplement	補充鎂離子	Mag. oxide [®] tab 250 mg (Mag. oxide) /Saline laxative	軟便、緩瀉、制酸

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Octreotide	治療肢端肥大症、治療食道 靜脈曲張性出血 /Antisecretory agent (somatostatin analog)	Sandostatin [®] inj 0.1 mg/ml 1 ml Sandostatin [®] LAR for inj 20 mg Sandostatin [®] LAR for inj 30 mg
Metronidazole	抗細菌 (抗生素) /Antiprotozoal, anaerobic antibiotic	Frothin [®] enteric SC tab 250 mg SABS [®] iv infu 5 mg/ml 100 ml Sutrol [®] gel-vaginal 7.5 mg/g 25 g

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Catilon [®] tab 40 mg 抗消化道痙攣	Buscopan [®] SC tab 10 mg 抗消化道及 泌尿道痙攣	銀色鋁箔、 黑色字體、 白色圓形錠
Transamin [®] inj 250 mg/5 ml 止血	Yutopar [®] inj 50 mg/5 ml 安胎	透明液體、 透明安瓿、 大小相近

4. 實例說明

案例 1 處方：Finibax[®] inj (Doripenem) 500 mg IVA Q8H，用於治療腎功能不良 (Ccr =19.8 ml/min) 之腹腔內感染病人。

建議：將 Finibax[®] 改為 250 mg Q12H。

說明：Finibax[®] 需依腎功能調整劑量，Ccr 11-29 ml/min 建議劑量為 250 mg Q12H。

案例 2 處方：Nesina[®] tab 25 mg (Alogliptin) 1 tab PO QD 併用 Trajenta[®] FC tab 5 mg (Linagliptin) 1tab PO QD 治療第二型糖尿病。

建議：停用 Nesina[®]。

說明：兩藥皆為 DPP-IV 抑制劑，不建議併用；如病情需要宜使用其他機轉藥品。