

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
109 年第 1 期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Ibrance [®] cap 125 mg (Palbociclib)	標靶治療 /CDK 4/6 inhibitor	Imbruvica [®] cap 140 mg (Ibrutinib)	標靶治療 /Tyrosine kinase inhibitor
V-Genta [®] inj 80 mg/2 ml (Gentamicin)	抗細菌/Antibiotic (Aminoglycoside)	Vitagen [®] inj 50% 20 ml (Dextrose)	補充葡萄糖 /Parenteral caloric nutrient

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Rivastigmine	治療失智症 /Reversible acetylcholinesterase inhibitor	Exelon [®] cap 3 mg Exelon [®] cap 4.5 mg Exelon [®] cap 6 mg Exelon [®] patch 5 (4.6 mg/24 h) Exelon [®] patch 10 (9.5 mg/24 h)
Clarithromycin	抗細菌 /Antibiotic (Macrolide)	Klaricid [®] tab 500 mg Klaricid [®] iv inj 500 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Rolikan[®] inj 7% 20 ml 鹼化劑</p> 	<p>Vitacal[®] inj 2% 20 ml 補充鈣質</p> 	<p>透明液體、 透明安瓿、 大小相近</p>
<p>Vanco[®] inj 1 g 抗細菌</p> 	<p>Sinatrix[®] for iv inj 1 g 抗細菌</p> 	<p>藍色瓶蓋、 透明瓶身、 白色標籤</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：Ciproxin[®] infu 2 mg/ml (Ciprofloxacin) 400 mg IVD Q12H 用於治療腎功能不良 (Ccr = 25 ml/min) 之腹腔內感染。

建議：將 Ciproxin[®] 改為 400 mg IVD QD。

說明：Ciproxin[®] infu 需依腎功能調整劑量，Ccr 10-50 ml/min 建議劑量為 400 mg QD。

案例 2 處方：Tegretol[®] CR FC tab 200 mg (Carbamazepine) 1 tab NGT QD 治療躁鬱症。

建議：將 Tegretol[®] CR FC tab 改以非特殊劑型的 Tegretol[®] tab 200 mg (Carbamazepine) 1 tab NGT QD 給藥。

說明：Tegretol[®] CR FC tab 為持續性藥效錠，不建議磨粉管灌給藥。