

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊
109年第2期





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Diagnogreen® inj 25 mg (Indocyanine green)	顯影劑 /Diagnostic agent	Diphereline® PR inj 11.25 mg (Triptorelin)	荷爾蒙 /Gonadotropin releasing hormone agonist
Miacalcic® inj 50 iu/ml (Calcitonin)	治療骨質疏鬆、高血鈣/Hypocalcemic hormones	Minirin® inj 4 ug/ml (Desmopressin)	治療尿崩症、夜間遺尿、止血 /Vasopressin analog

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Estradiol	荷爾蒙/Estrogen derivative	Divigel® gel 0.1% 1 g Estrad® gel 0.06% 2.5 g Estrade® tab 2 mg
Palbociclib	標靶治療/CDK 4/6 inhibitor	Ibrance® cap 100 mg Ibrance® cap 125 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Lasix® inj 20 mg/2 ml 利尿、降血壓</p> 	<p>Setoral® inj 0.3 mg/2 ml 止吐</p> 	<p>白色標籤、 棕色安瓿、 大小相近</p>
<p>Arcoxia® tab 60 mg 止痛消炎</p> 	<p>Singlair® tab 10 mg 治療氣喘</p> 	<p>藍色標示、 銀色鋁箔、 七錠排裝</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：Depakine® gastro-resistant tab 200 mg (Valproate) 1 tab NGT Q8H 用於治療癲癇。
建議：改為 Depakine® oral sol 200 mg/ml 1 ml NGT Q8H。
說明：Depakine® gastro-resistant tab 為腸溶錠，破壞劑型易刺激胃黏膜，不建議磨粉管灌給藥。

案例 2 處方：Supercillin® cap 250 mg (Amoxicillin) 2 cap PO Q8H 用於治療腎功能不良 (Ccr = 7.8 ml/min) 之牙周炎病人。
建議：將 Supercillin® 改為 2 tab PO QD。
說明：Amoxicillin 需依腎功能調整劑量，Ccr < 10 ml/min 建議劑量為 250 - 500 mg QD。