





1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Chlorpheniramine [®] inj 5 mg/1 ml (Chlorpheniramine)	抗過敏 /First generation H1 antagonist	Chloraminophene [®] cap 2 mg (Chlorambucil)	化學治療 /Alkylating agent
Methycobal [®] cap 500 mg (Mecobalamin)	維他命 B12 /Vitamin B12	Methyldopa [®] FC tab 250 mg (Methyldopa)	降血壓 /α2-adrenergic agonist

2. 多種含量與劑型

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Cyproheptadine	增進食慾、抗過敏 /First generation H1 antagonist	Cyproh [®] sol 0.4 mg/ml 60 ml Cyproh [®] tab 4 mg Pilian [®] tab 4 mg
Lacosamide	抗癲癇/Anticonvulsant	Vimpat [®] for infu 10 mg/ml 20 ml Vimpat [®] FC tab 100 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
<p>Vanco[®] inj 1 g 抗細菌、抗生 素</p> 	<p>Cefoxitin[®] inj 1000 mg 抗細菌、抗生 素</p> 	<p>藍色瓶蓋、 白色乾粉、 透明玻璃瓶、 大小相似</p>
<p>Jardiance[®] FC tab 25 mg 降血糖</p> 	<p>Glyxambi[®] FC tab 25/5 mg 降血糖</p> 	<p>黑色標示、 銀色鋁箔、 十錠排裝</p>

4. 實例說明

案例 1 處方：Plendil[®] ER tab 5 mg (Felodipine) 1 tab NGT QD 用於治療高血壓。

建議：改為 Norvasc[®] tab 5 mg 1 tab NGT QD。

說明：Plendil[®] ER tab 為持續性釋放錠，破壞劑型無法延長藥效時間，不建議磨粉管灌給藥。

案例 2 處方：Rifinah-300[®] SC tab (RMP 300 mg + INH 150 mg) 2 tab PO QD 用於治療體重 45 kg 之結核病人。

建議：改為 Rifinah-150[®] SC tab (RMP 150 mg + INH 100 mg) 3 tab PO QD。

說明：Rifinah[®] 需依體重調整劑量，體重小於 50 kg 建議劑量為 Rifinah-150[®] 3 tab QD，體重大於 50 kg 建議劑量為 Rifinah-300[®] 2 tab QD。