

臺北榮總藥學部調劑/給藥警訊  
110 年第 1 期

1. 拼字相似之藥品

藥名(1)	用途/類別	藥名(2)	用途/類別
Lescol <sup>®</sup> XL tab 80 mg (Fluvastatin)	降血脂 /HMG-CoA reductase inhibitor	Livalo <sup>®</sup> FC tab 2 mg (Pitavastatin)	降血脂 /HMG-CoA reductase inhibitor

2. 多種含量、劑型與廠牌

藥名	用途/類別	商品名、劑型、含量
Methotrexate	化學治療、調節免疫 /Antimetabolite	Methotrexate <sup>®</sup> inj 1 g/10 ml Methotrexate <sup>®</sup> inj 50 mg/2 ml Methotrexate <sup>®</sup> tab 2.5 mg
Posaconazole	抗黴菌/Azole derivative	Posanol <sup>®</sup> for inf 18 mg/ml 16.7 ml Posanol <sup>®</sup> tab 100 mg
Thiotepa	化學治療/Alkylating agent	Tepadina <sup>®</sup> inj 100 mg Thiother <sup>®</sup> inj 100 mg

3. 外型相似之藥品

藥名(1)	藥名(2)	相似處
Chlorpheniramine <sup>®</sup> inj 5 mg/1 ml 抗過敏	Zinc sulfate <sup>®</sup> inj 5.94 mg/1 ml 補充鋅	白色標示、 透明安瓿、 大小相似
Urief <sup>®</sup> FC tab 4 mg 改善排尿困難、 攝護腺肥大症狀	Glufast <sup>®</sup> tab 10 mg 降血糖	黑色標示、 銀色鋁箔、 十四錠排裝

4. 實例說明

**案例 1** 處方：Zavancefta<sup>®</sup> inj (Ceftazidime 2 g+ Avibactam 0.5 g) 2.5 g IVA Q8H 用於腎功能不良 (Ccr = 35 ml/min) 之肺炎病人。

建議：改為 Zavancefta<sup>®</sup> inj 1.25 g IVA Q8H。

說明：Zavancefta<sup>®</sup> inj 需依腎功能調整劑量，Ccr 介於 31-50 ml/min 建議劑量為 1.25 g Q8H。

**案例 2** 處方：Pradaxa<sup>®</sup> cap 110 mg (Dabigatran) 1 cap NGT BID 用於預防心房顫動發生中風與全身性栓塞。

建議：改為 Xarelto<sup>®</sup> FC tab 15 mg 1 tab NGT QDCC。

說明：本院直接口服抗凝血劑共有 Eliquis<sup>®</sup> FC tab (Apixaban)、Lixiana<sup>®</sup> FC tab (Edoxaban)、Pradaxa<sup>®</sup> cap (Dabigatran) 及 Xarelto<sup>®</sup> FC tab (Rivaroxaban)，其中 Pradaxa<sup>®</sup> 不可打開膠囊、不可磨粉，破壞劑型可能導致本藥生體可用率增加 1.4 倍而提高出血機率；其餘三藥皆可磨粉。