

# 眼底螢光血管攝影須知

## Ocular angiography

台北榮總眼科門診  
護理指導單 No28

### 一、檢查目的：

眼底螢光血管攝影(FAG)是一種侵入式的檢查，是由手臂靜脈注入螢光劑，再由眼底相機照出黃斑部及視網膜血管的變異情形，可作為醫師診斷及後續治療的參考輔助。

### 二、檢查注意事項：

- (一)眼底螢光血管攝影，雖有一些副作用，但危險性卻極低。但若您正在餵母乳，請暫停4天。
- (二)若您有對任何藥物過敏的情形，請告訴醫護人員。
- (三)如果您瞭解並同意做此項檢查，請填妥檢查同意書。按預約時間，攜帶預約單及健保IC卡至第三門診七樓眼科雷射室報到。
- (四)檢查當日可正常飲食服用藥物，檢查室空調較涼請攜帶外套一件。
- (五)報到後，護理人員會為您測量血壓，點散瞳藥。
- (六)注射時偶有噁心的感覺，只要深呼吸即可改善。
- (七)注射部位如有疼痛或其他不適，請立即告知醫師及檢查人員，我們會妥善處理，請勿驚慌。
- (八)注射後皮膚及小便會立即變黃，48小時內請多喝水，幫助藥物由尿液排出。
- (九)放大瞳孔後，會有視力模糊及畏光的現象，檢查當日請勿自行開車或騎機車來，約8小時後會恢復原有視力。
- (十)攝影後，請依約按時回診，屆時由醫師說明攝影結果。

### 文獻參考

吳慈恩、陳涵栩(2014)。*糖尿病網膜病變*。臨床醫學，74，58-65。

臺北榮民總醫院眼科部(2015，12月22日)。*淺談老年型黃斑部病變*。2015年12月22日取自 <http://homepage.vghtpe.gov.tw/~oph/>

衛生福利部國民健康署(2015，1月30日)。*失明危機！去年糖尿病人眼底檢查率僅1/3！*。2015年12月10日取自 <http://www.hpa.gov.tw/BHPNet/Web/News/News.aspx?No=201310090001>。

Velez, M. R., Olson, I. L. & Mandava, N. (2013). Fluorescein angiography and indocyanine green angiography. *Ophthalmology*. (4nd ed., pp.6-6) St. Louis, MO:Elsevier Mosby.

AK-Fluor, Bio Glo, Fluor-I-Strips A.T., Fluorescite, Ful-Glo, GloStrips (2019, May 24) Fluorescein. Retrieved from <https://www.drugs.com/cdi/fluorescein.html#>.

86年7月制定 108年10月第五次修訂

台北榮總 眼科門診 關心您