

眼底螢光血管攝影須知

Fundus fluorescein angiography



【本篇學習重點】

1. 檢查耗時約 2 小時，散瞳後視力模糊約 6-8 小時。
2. 注射後 48 小時內請多喝水多排尿，減少體內螢光劑殘留。

一、什麼是眼底螢光血管攝影：

眼底螢光血管攝影(FAG)是一種侵入式的檢查，是由手臂靜脈注入螢光劑，再由眼底相機照出黃斑部及視網膜血管的變異情形，可作為醫師診斷及後續治療的參考輔助。

二、檢查要注意什麼？：

- (一)眼底螢光血管攝影，雖有一些副作用，但危險性卻極低。但若您正在餵母乳，因螢光劑會分泌到乳汁中，請暫停哺乳 4 天。
- (二)若您有任何藥物過敏、腎功能異常情形，請告知醫護人員，經醫師評估是否能做此項檢查。
- (三)若您瞭解並同意做此項檢查，請填妥檢查同意書。

三、檢查是如何進行的？：

- (一)攜帶預約單及健保 IC 卡準時至第三門診七樓眼科雷射室報到。
- (二)檢查當日可正常飲食服用藥物，檢查室空調較涼，請自備保暖衣物。
- (三)報到後，護理人員會為您測量血壓，點散瞳眼藥，直到瞳孔放大。
- (四)步行至進階檢查區注射螢光劑，注射時若有噁心感，建議深呼吸即可改善。
- (五)注射與眼底攝影同步進行，請配合擺位約 20 分鐘。
- (六)注射部位如有疼痛或其他不適，請立即告知檢查人員，我們會妥善處理，請勿驚慌。

四、檢查後該注意什麼？：

- (一)注射後皮膚及小便會立即變黃，48 小時內請多喝水，幫助藥物由尿液排出。
- (二)散大瞳孔後會有視力模糊及畏光的現象，檢查當日請勿自行開車或騎車，約 8 小時後會恢復原有視力。
- (三)攝影後，請依約回診，屆時由醫師說明攝影結果。

臺北榮總 眼科門診 關心您