<table>
<tr><td>檢驗項目</td><td colspan="4">Reticulocyte Count</td></tr>
<tr><td>中文名稱</td><td colspan="4">網狀紅血球計數</td></tr>
<tr><td>英文名稱</td><td colspan="4">Reticulocyte Count</td></tr>
<tr><td>適應症</td><td colspan="4">主要評估骨髓的紅血球造血功能及貧血治療的療效。
1.紅血球造血增加、網狀紅血球升高，可能病症如:原發或繼發性溶血症、血紅素尿症、血紅素病變、急性出血症、缺鐵性貧血等。
2.紅血球造血低下、網狀紅血球減少，可能病症如:惡性貧血、再生不良貧血及骨髓衰竭等。</td></tr>
<tr><td>操作科別</td><td colspan="4">一般檢驗科-907</td></tr>
<tr><td>檢體類別</td><td colspan="4">血液</td></tr>
<tr><td>操作頻率</td><td colspan="4">週一至週五：8:00 - 17:30；假日(含彈性門診)：8:00 - 16:00。</td></tr>
<tr><td>操作時效</td><td colspan="4">急做檢體：1 小時，一般檢體：4 小時。</td></tr>
<tr><td>參考範圍</td><td colspan="4"><table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">檢驗項目</td><td colspan="2">參考值</td></tr>
<tr><td>男</td><td>女</td></tr>
<tr><td>網狀紅血球百分比</td><td>%Retic</td><td colspan="2">0.83-2.24 %</td></tr>
<tr><td>網狀紅血球絕對值</td><td>#Retic</td><td>0.044-0.115 × 10^6/μL</td><td>0.036-0.100 × 10^6/μL</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>採檢容器和檢體量</td><td colspan="4">
紫頭管：採取 2 mL 全血</td></tr>
<tr><td>採檢注意事項</td><td colspan="4">採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。</td></tr>
<tr><td>收檢時間與地點</td><td colspan="4"><table>
<tr><td>收檢地點</td><td>平日收檢時間</td><td>週六收檢時間</td><td>週日收檢時間</td></tr>
<tr><td>中正樓三樓
一般檢驗科</td><td>8:00-17:00</td><td>8:00-16:00</td><td>8:00-16:00</td></tr>
<tr><td>第二門診大樓
門診檢驗室</td><td>7:30-21:30</td><td>7:30-12:00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>中正樓三樓
急診檢驗室</td><td colspan="3">24 小時收檢</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	國定假日、天災停止上班比照週日收檢時間。
注意事項	.飲食限制：無。 .用藥限制：無。 .抗凝血劑：EDTA。 .保存方法：室溫(立即送檢)。 .運送條件：室溫。
健保代碼與給付點數	健保碼：08008C；健保點數：30 點。
檢驗方法	. 檢驗原理： 以核酸含量和細胞大小區分網狀紅血球。 . 干擾因素： 凝固(Clot)、溶血會干擾網狀紅血球的計數。
聯絡電話	02-28712121 轉病房檢驗室：3215。
版本 2021.10.06	修訂日期： 2022 年 1 月 16 日