

兒童外科手術

- 一般來說新生兒體重在兩公斤以上就可以在設備齊全的醫學中心安全的接受麻醉、手術。
- 兩公斤以下的新生兒，手術及麻醉的風險皆較高，但必要時仍必須承擔風險接受緊急救命手術。

手術前、中、後注意事項

手術前

- 依照醫師指示術前準備
- 禁食時間
 - ▣ 新生兒 – 至少4小時（喝全母乳者4小時，配方奶者6小時）
 - ▣ 6個月以下 – 禁食 6 小時
 - ▣ 6個月以上 – 禁食 8 小時

手術前、中、後注意事項

手術中

- 手術室保溫措施：提高室內溫度、溫水床墊、烤燈、輸液加溫、溫熱毯子（重大手術建議自費使用「進階體溫管理系統」）
- 護理人員：安撫病童，手術前準備，預防壓瘡
 - 父母可在旁陪伴，直到病童睡著
- 麻醉醫師：選擇適當的麻醉方式
 - 局部麻醉
 - 靜脈注射全身麻醉、面罩吸入性全身麻醉
 - 喉頭罩、氣管內管插管全身麻醉
- 手術醫師：綜理全局、決定手術姿勢，置入各式導管、仔細小心的進行手術

手術前、中、後注意事項

手術後

- 是否有需要住院？
 - ▣ 3個月以下的小孩建議住院觀察一晚：麻醉後可能有呼吸抑制情形
- 若醫師評估不需住院，小朋友於恢復室在家屬安撫陪伴下密切觀察兩小時，待麻醉醫師評估完全甦醒後即可返家
- 全身麻醉術後可能有輕微發燒
- 依照醫囑給予止痛藥、傷口照護、進食